

Hitaxa Fast Kids, roztwór doustny 0,5mg/ml, 60 ml



Cena: 17,01 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	60 ml
Dawka	500 mcg/ml
Opakowanie	60 ml
Postać	roztwór doustny
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Desloratadinum
Wiek	od 2 roku życia

Opis produktu

Opis

Hitaxa Fast Kids roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, niewywołującym senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów. Łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarzem siennym lub uczuleniem na roztocza). Hitaxa Fast Kids jest stosowany również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

Wskazania

Produkt Hitaxa Fast Kids jest wskazany u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku powyżej 2 lat do 5 lat: 2,5 ml roztworu doustnego raz na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml roztworu doustnego raz na dobę.
- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 10 ml roztworu doustnego raz na dobę.

Skład

Substancją czynną leku jest desloratadyna. Jeden ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny. Pozostałe składniki: hypromeloza typ 2910, sukraloza (E 955), kwas cytrynowy, bezwodny, sodu cytrynian, sorbitol ciekły, niekryształujący (E 420), glikol propylenowy (E 1520), aromat Tutti Frutti, płynny (glikol propylenowy, substancje smakowo-zapachowe), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Hitaxa Fast Kids jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku ,

lub na loratadynę.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.