Iberogast, płyn doustny, od 6 roku życia, 20 ml

Cena: 33,21 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	20 ml
Postać	płyn doustny
Producent	STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Produkt złożony
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Opis
Iberogast, lek roślinny do stosowania w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. Iberogast zwiększa stężenie chroniących błonę śluzową prostaglandyn i mucyny, obniża stężenie niszczących błonę śluzową leukotrienów. Hamuje wydzielanie soku żołądkowego przez komórki okładzinowe żołądka.

Wskazania
Lek stosowany w przypadku zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego - zespół jelita nadwrażliwego, dyspepsja (niestrawność) czynnościowa.

Działanie

- Zmniejsza uczucie pełności, wzdęcia, osłabia skurcze żołądka i jelit.
- Przeciwzapalne, wiatropędne, przeciwutleniające i przeciwbakteryjne.

Dawkowanie
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej:

- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 20 kropli 3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 15 kropli 3 razy na dobę.

Stosować doustnie, z małą ilością płynu przed lub w czasie posiłków.

Skład
100 ml płynu zawiera: Wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego (1:1,5-2,5) 15,0 ml, ekstrahent - etanol 50% (v/v), Wyciąg z korzenia arcydzięgla (1:2,5-3,5) 10,0 ml, Wyciąg z kwiatu rumianku (1:2-4) 20,0 ml, Wyciąg z owocu kminku (1:2,5-3,5) 10,0 ml, Wyciąg z owocu ostropestu (1:2,5-3,5) 10,0 ml, Wyciąg z liści melisy (1:2,5-2,5) 10,0 ml, Wyciąg z liści mięty pieprzowej (1:2,5-3,5) 5,0 ml, Wyciąg z ziela glistnika (1:2,5-3,5) 10,0 ml, Wyciąg z korzenia lukrecji (1:2,5-3,5) 10,0 ml, Ekstrahentem stosowanym do otrzymania pozostałych wyciągów jest

etanol 30% (v/v).
Iberogast zawiera 29,5-32,6% (v/v) etanolu.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku.
- Nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 6 lat.

Działania niepożądane
W bardzo rzadkich przypadkach (rzadziej niż 1 na 10 000) mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości takie jak np. wysypka, świąd, duszność.

Przechowywanie

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria