

# Ibument 50 mg/ g + 30 mg/ g, żel, 100 g



Cena: 18,99 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 g
Dawka	50 mg/ g + 30 mg/ g
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Producent	ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum, Levomentholum

## Opis produktu

### Wskazania

- Leczenie bólu i obrzęków wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręceń stawów), kontuzji sportowych.
- Po konsultacji z lekarzem może być stosowany w leczeniu: bólów reumatycznych, w tym bólów stawów spowodowanych zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, bólu pleców, lumbago, bólów mięśniowych, bólów w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach.

### Działanie

Miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

### Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: nałożyć żel (1 do 4 cm żelu) na bolące miejsce i delikatnie wmasować, aż do wchłonięcia leku. Jeśli jest potrzeba powtarzać, maksymalnie do 3 razy na dobę. Nie stosować żelu częściej, niż co 4 godziny. Po użyciu żelu należy umyć ręce, chyba że są one miejscem leczonym. Miejsc nałożenia żelu nie należy przykrywać opatrunkami, takimi jak bandaże czy plastry. Maksymalny czas trwania leczenia to dwa tygodnie. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

### Skład

Substancjami czynnymi leku są ibuprofen i lewomentol. 1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg lewomentolu. Pozostałe składniki: etanol 96%, karbomer 980, glikol propylenowy, diizopropanolamina 85%, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

### Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25oC.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Ciąża i okres karmienia piersią - stosowanie po konsultacji z lekarzem.

**Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.