

Ibuvit D3 2000 IU, 60 kapsułek miękkih



Cena: 26,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	60 kapsułek miękkih
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cholecalciferolum

Opis produktu

Opis

Ibuvit D3 2000 IU, suplement diety w postaci kapsułek miękkih dla dzieci powyżej 11 roku życia, młodzieży i dorosłych. Witamina D jest potrzebna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci. Pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystaniu wapnia i fosforu oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Wspomaga utrzymanie zdrowych zębów i w prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zastosowanie

Uzupełnienie diety w składniki suplementu diety.

Zalecane spożycie

- Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 11 lat i powyżej: zazwyczaj 1 kapsułka na dobę u pacjentów z prawidłową masą ciała, w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.
- Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: zazwyczaj 1 kapsułka na dobę niezależnie od pory roku.
- Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią w porozumieniu z lekarzem: zazwyczaj 1 kapsułka dziennie, niezależnie od pory roku, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Skład

Substancja czynna: cholekalcyferol.

1 kapsułka zawiera: 50 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 2000IU witaminy D.

Pozostałe składniki: zawartość kapsułki: olej krokoszowy oczyszczony. Skład otoczki kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 30oC.
- W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować:

- przy uczuleniu na cholekalcyferol lub którykolwiek składnik preparatu.
- u dzieci poniżej 11 lat.
- przy podwyższonym stężeniu wapnia we krwi lub moczu.
- przy ciężkiej niewydolności nerek, kamieniach w nerkach lub pacjent ma skłonność do powstawania kamieni w nerkach.
- przy podwyższonym stężeniu witaminy D we krwi.
- Ciąża i karmienie piersią - przyjmowanie po konsultacji z lekarzem.

Dodatkowe informacje

- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
- Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.