


Idroflog roztwór okulistyczny, 15 ampułek po 0,5 ml



Cena: 54,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15 ampułek po 0,5 ml
Postać	roztwór okulistyczny
Producent	SOLINEA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis produktu

Idroflog to roztwór okulistyczny zawierający hialuronian sodu i fosforan sodowy hydrokortyzonu. Hialuronian sodu równomiernie rozprowadza się na gałce ocznej tworząc barierę ochronną, przez co zmniejsza tarcie wywołane ruchami gałki ocznej i stabilizuje film łzowy. Krople Idroflog ułatwiają procesy naprawcze, przez co zmniejszają ryzyko procesów zapalnych. Dzięki zastosowaniu środka na bazie kortyzonu- fosforanu sodowego hydrokortyzonu, Idroflog zmniejsza ryzyko nawrotów stanów zapalnych.

Wyrób nie zawiera środków konserwujących i może być również stosowany podczas jednoczesnego użytkowania soczewek kontaktowych.

Zastosowanie

Krople do oczu zmniejszające ryzyko stanów zapalnych i działające ochronnie na rogówkę oka przed działaniem czynników zewnętrznych.

Sposób użycia

- Dawkowanie jest indywidualne, uzależnione od stanu zdrowia, oraz zaleceń lekarza okulisty.
- Zazwyczaj stosuje się 1-2 krople roztworu do worka spojówkowego, od 2 do 4 razy na dobę.
- Całkowity czas leczenia wynosi 2-6 miesięcy, stale kontrolowany przez lekarza, zaleca się wizytę kontrolną co 30-45 dni.

Składniki

Hialuronian sodu 2 mg/ml; fosforan sodowy hydrokortyzonu 10 µg/ml; cytrynian trisodowy; chlorek sodu; chlorek potasu; chlorek magnezu; fosforan sodu dwuzasadowy; fosforan sodu jednozasadowy; woda do wstrzykiwań.

Przechowywanie

- Produkt jednorazowego użytku: po pierwszym zastosowaniu należy wyrzucić ampułkę, nawet jeśli zawiera resztki roztworu.
- Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu lub inne substancje podobne pod względem chemicznym.
- Nie stosować w przebiegu wirusowego zakażenia powierzchni oka, wrzodowego zapalenia rogówki, grzybicy oka, ropnego zapalenia spojówek, ropnego i opryszczkowego zapalenia błony śluzowej oka, jęczmienia.
- Zasadniczo przeciwwskazany w ciąży, w okresie karmienia piersią i u dzieci.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.