

Iladiamed (1 mg + 10 g)/g, żel, 30 g



Cena: 21,51 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 g
Dawka	(1 mg + 10 g)/g
Opakowanie	30 g
Postać	żel
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Octenidinum, Phenoxyethanolum

Opis produktu

Wskazania

- W obrębie narządów rodnych np. w stanach zapalnych pochwy, a także w stanach zapalnych żołądźi prącia mężczyzny;
- Wielokrotne, krótkotrwałe leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądźi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego.

Działanie

Lek działa miejscowo odkażająco, bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo.

Dawkowanie

- Lek należy nanosić na leczony obszar co najmniej raz na dobę, zwracając uwagę na równomierne pokrycie całej leczonej powierzchni.
- Antyseptyka błony śluzowej pochwy: lek należy nanieść na powierzchnię błony śluzowej pochwy za pomocą dołączonego aplikatora/kaniuli, najlepiej w pozycji leżącej z lekko ugiętymi nogami. Jeżeli po upływie 7 dni nie nastąpi poprawa lub w okresie do 7 dni od rozpoczęcia stosowania leku pacjentka czuje się gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza ginekologa.
- Antyseptyka żołądźi prącia mężczyzny: lek należy nanieść na powierzchnię błony śluzowej żołądźi prącia, zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez co najmniej 1 minutę. Lek można również nanosić za pomocą jałowego gazika lub przymoczek. Pierwszego dnia leczenia należy zastosować lek rano i wieczorem. Następnie przez kolejne 6 dni raz na dobę. Jeżeli po upływie 7 dni nie nastąpi poprawa lub w okresie do 7 dni od rozpoczęcia stosowania leku pacjent czuje się gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Dezynfekcja skóry i błon śluzowych: obszary skóry i błon śluzowych, które mają być poddane dezynfekcji, należy dokładnie i równomiernie pokryć niewielką ilością leku. Lek można również nanosić za pomocą jałowego gazika lub przymoczek. Po zastosowaniu leku należy odczekać co najmniej 1 minutę, wskazane jest przedłużenie czasu oddziaływania do 5 minut.

Skład

Substancjami czynnymi są Oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol.

1 g żelu zawiera 1 mg oktenidyny dichlorowodoru i 10 mg fenoksyetanolu.

Substancje pomocnicze: poloksamer 407, glicerol 85%, etanol 96%, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub którykolwiek składnik leku.
- Nie należy wprowadzać do jamy brzusznej ani wewnątrz ucha (na błonę bębenkową).

Działania niepożądane

- Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób): po dezynfekcji pochwy może wystąpić odczuwane wrażenie ciepła lub pieczenia; odczucie pieczenia, zaczerwienienie, świąd, uczucie ciepła.
- Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób): kontaktowe reakcje uczuleniowe np. przemijające zaczerwienienie w miejscu zastosowania.
- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): po przepłukaniu głębokich ran za pomocą strzykawki donoszono o przypadkach uporczywego obrzęku, rumienia i martwicy tkanki, w niektórych przypadkach wymagających interwencji chirurgicznej

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby wynosi 6 miesięcy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Leku tego nie wolno połykać ani dopuszczać do przedostania się do krwiobiegu, np. w wyniku przypadkowego wstrzyknięcia.
- W celu uniknięcia uszkodzenia tkanek i obrzęku miejscowego, leku tego nie wolno podawać za pomocą strzykawki do głębokich tkanek. Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego na skórę i błonę śluzową.
- Należy usunąć nadmiar leku upewniając się, że żel nie pozostaje na skórze dłużej, niż to konieczne.
- Nie należy stosować leku do oka. W razie kontaktu leku z oczami, należy niezwłocznie je przepłukać dużą ilością wody.
- Stosowanie tego leku po zabiegu episiotomii (nacięcie krocza) należy skonsultować z lekarzem ginekologiem.
- Stosowanie innych leków: należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować tego leku jednocześnie z antyseptykami na bazie PVP-jodu (kompleks jodu z powidonem) na sąsiadujących obszarach ciała, ponieważ może dojść do silnych brązowych lub fioletowych przebarwień skóry.

Nie należy dopuścić do kontaktu tego leku z mydłem i detergentami, gdyż mogą powstać trudno rozpuszczalne pozostałości. Może to doprowadzić do osłabienia lub zniesienia działania leku.

- Ciąża i karmienie piersią: jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Lek zawiera 50 mg alkoholu (etanolu) w każdym g żelu. Lek może powodować pieczenie uszkodzonej skóry.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.