

Immunofort, płyn doustny, wsparcie odporności, 125 g

Cena: 23,31 zł



Opis słownikowy

Cena jednostkowa	125 g
Opakowanie	125 g
Postać	płyn doustny
Producent	TADEUSZ POLAŃSKI PRZEDSIĘB.FARMACEUTYCZNE "LEKI NATURY"
Rejestracja	Lek

Opis produktu

Wskazania

- Krótkoterminowe leczenie przeziębień,
- Środek pomocniczy w infekcjach górnych dróg oddechowych,
- Zapobiegawczo w skłonnościach do częstych przeziębień.

Działanie

Składniki leku wspierają układ odpornościowy.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: doustnie 5 ml leku 3 razy dziennie.
- Odmierzyć pojedynczą dawkę korzystając z miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą lub sokiem owocowym i całość wypić. W razie potrzeby popić wodą.
- Należy stosować nie dłużej niż 10 dni.

Skład

Substancjami czynnymi są (na 100 g produktu): Sok z zieleńki jeżówki purpurowej (Echinaceae purpureae herbae recentis succus) DER 1:1 rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 96% (V/V) 40,0g, Sok z owoców aronii (Aroniae fructus succus) DER1:1 rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 96% (V/V) 30,0g, Sok z korzenia łopianu (Bardanae radice recentis succus) DER 1:1 rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 96% (V/V) 10,0g, Wyciąg płynny z koszyczków rumianku (Chamomilae extractum fluidum) DER 0,5-1 rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% (V/V) 10,0g, Sok z zieleńki pokrzywy (Urticae herbae recentis succus) DER 1:1 rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 96% (V/V) 10,0g. Zawartość etanolu 28-36% (V/V)

Przeciwwskazania

- Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość

alkoholu.

- Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą lub na rośliny z rodziny astrowatych dawniej złożonych (Asteraceae dawniej Compositae).
- Nie jest wskazany w postępujących chorobach układowych, chorobach autoimmunologicznych, upośledzeniu odporności, immunosupresji i chorobach krwi dotyczących układu białych krwinek.
- Ciąża i okres karmienia piersią - po konsultacji z lekarzem.

Działania niepożądane

- Mogą wystąpić przypadki nadwrażliwości na jeżówkę i rumianek, charakteryzujące się wysypką, pokrzywką, świądem, zespołem Stevensa-Johnsona, obrzękiem naczynioruchowym, obrzękiem Quinckego, skurczem oskrzeli, astmą i reakcja anafilaktyczna. Częstotliwość występowania działań niepożądanych nie została ustalona.
- Echinacea (jeżówka) może wywołać reakcje anafilaktyczne u osób z atopią. Nie jest wykluczony związek z chorobami autoimmunologicznymi (stwardnienie rozsiane, rumień guzowaty, zespół Evansa, zespół Sjögrena z niewydolnością nerek). W wyniku długotrwałego stosowania (powyżej 8 tygodni) może wystąpić leukopenia.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.