

# Inaldin Gardło, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Cena: 17,99 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 ml
Dawka	1,5 mg/ml
Opakowanie	30 ml
Postać	aerozol do stosowania w jamie ustnej
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Benzydaminum

## Opis produktu

### Wskazania

Aerozol do stosowania w jamie ustnej, stosowany w leczeniu objawów (ból, zaczerwienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

### Działanie

Miejscowe działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz miejscowo znieczulająco na błonę śluzową jamy ustnej.

### Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: od 4 do 8 dawek aerozolu od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5-3 godziny.
- Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki aerozolu od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5-3 godziny.
- Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka aerozolu na 4 kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5-3 godziny. Bez względu na masę ciała jednorazowo nie należy stosować więcej niż 4 dawek aerozolu.

### Skład

Substancją czynną leku jest: chlorowodorek benzydaminu (Benzydaminu hydrochloridum).

1 ml roztworu zawiera 1,5 mg chlorowodoru benzydaminu.

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), sodu cyklamianian (E 952), glicerol (E 422), sodu wodorowęglan, polisorbát 80, etanol 96%, aromat mięty pieprzowej (zawierający olejek mięty pieprzowej, etanol, mentol), kwas fosforowy stężony (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Uczulenie na benzydminy chlorowoderek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

### Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25oC.
- Po pierwszym użyciu okres ważności wynosi 160 dni.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Stosowanie tego leku należy omówić z lekarzem lub farmaceutą jeśli pacjent jest uczulony na kwas acetylosalicylowy, inne leki z grupy NLPZ lub jeśli występuje lub w przeszłości wystąpiła astma oskrzelowa lub choroby alergiczne.
- Jeśli po 3 dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ w rzadkich przypadkach owrzodzenie policzków lub gardła może być spowodowane przez ciężką chorobę podstawową.
- Nie należy stosować tego leku dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.
- Unikać kontaktu leku z oczami.
- Wkrótce po przyjęciu leku może wystąpić uczucie drętwienia w jamie ustnej lub gardle. Należy unikać jedzenia i picia do czasu ustąpienia uczucia drętwienia.
- Tego leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Lek ten zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218), który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
- Lek zawiera etanol: zawiera 81,40 mg alkoholu (etanol) w każdym mililitrze co odpowiada 13,84 mg / 0,17 ml (jedna dawka).
- Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej dawce (0,17 ml).

### Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

## Galeria



**BÓL**

**DZIAŁA ZNIECZULAJĄCO**  
**ZWALCZA BÓL**  
**LECZY STAN ZAPALNY**

**Inaldin Gardlo, 1,3 mg/ml. Szkiełko** - Inka dawka amarylo 0,17 ml zawiera 253 mcg benzydminy chlorowodorku (Benzydminy chlorowodorku). Poziwe farmakologiczne amarylo do stosowania w jamie ustnej, ustnie. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów bólu, uczucie zmęczenia, objawy migreny w stanach zapalnych jamy ustnej, gardła. Podstawy informacyjności: Strona: HealthMarket.pl/med/2017/Lab-Diag-Czytani-Badania-Ciepota-Tymor-JL-2019711-114444

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



**DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA**

		<b>Inaldin GARDLO</b>	
	<b>Dzieci poniżej 6 roku życia</b>	<b>1 dawka</b> na 4 kg masy ciała	<b>2-6 razy</b> na dobę
	<b>Dzieci od 6 do 12 lat**</b>	<b>4 dawki</b>	<b>2-6 razy</b> na dobę
	<b>Dorośli i dzieci &gt;12 roku życia**</b>	<b>4-8 dawek</b>	<b>2-6 razy</b> na dobę

\*\*Wskazania do stosowania: Leczenie objawów bólu, uczucie zmęczenia, objawy migreny w stanach zapalnych jamy ustnej, gardła. Podstawy informacyjności: Strona: HealthMarket.pl/med/2017/Lab-Diag-Czytani-Badania-Ciepota-Tymor-JL-2019711-114444

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.