

Inaldin Gardło, 3 mg, 20 tabletek do ssania



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Cena: 15,75 zł

Opis słownikowy

Dawka	3 mg
Opakowanie	20 tabletek do ssania
Postać	tabletki do ssania
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

Wskazania

Leczenie objawów (ból, zaczerwienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła. Do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i powyżej.

Działanie

Miejscowe działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz miejscowo znieczulająco na błonę śluzową jamy ustnej.

Dawkowanie

- Dzieci od 6 roku życia, dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 tabletką 3 razy na dobę.
- Lek jest przeznaczony do stosowania na śluzówkę jamy ustnej. Tabletki należy ssać. Nie należy ich rozgryzać ani połykać.
- Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni.

Skład

Substancją czynną jest Benzydaminum hydrochloridum.

Każda tabletką do ssania zawiera 3 mg benzydaminum chlorowodorku (co odpowiada 2,68 mg benzydaminum).

Substancje pomocnicze: mannitol (E 421), kwas cytrynowy, hypromeloza, aromat mięty pieprzowej (zawierający naturalny aromat mięty pieprzowej, maltodekstrynę kukurydzianą, skrobię modyfikowaną kukurydzianą E 1450), aspartam (E 951), błękit patentowy V (E 131), żółcień chinolinowa (E 104), magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przechowywanie

W temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera źródło fenyloalaniny, aspartam (E 951). Może być szkodliwy dla pacjentów z fenylketonurią. Zachować ostrożność, jeśli pacjent ma astmę lub uczulenie na inne leki.

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria

