

Inaldin Gardło Max, 3 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór, 30 ml



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Cena: 18,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 ml
Dawka	3 mg/ml
Opakowanie	30 ml
Postać	aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie bóli u podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła u dorosłych.

Działanie

Miejscowe działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz miejscowo znieczulająco na błonę śluzową jamy ustnej.

Dawkowanie

- Dorośli od 2 do 4 dawek każdorazowo, od 2 do 6 razy na dobę.
- Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni i należy skontaktować się z lekarzem, jeśli w ciągu 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej.

Skład

1 ml zawiera 3 mg benzydaminu chlorowodoru co odpowiada 2,68 mg benzydaminu.

Każda dawka produktu (0,17 ml) zawiera 510 mikrogramów benzydaminu chlorowodoru, co odpowiada 456 mikrogramom benzydaminu.

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), sodu cyklamian (E 952), glicerol (E 422), sodu wodorowęglan, polisorbata 80, etanol 96%, aromat mięty pieprzowej (zawierający olejek mięty pieprzowej, etanol, mentol), kwas fosforowy stężony (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne.
- Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Po pierwszym użyciu okres ważności wynosi 160 dni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Zachować ostrożność jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał astmę.
- Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria



BÓL

DZIAŁA ZNIECZULAJĄCO
ZWALCZA BÓL
LECZY STAN ZAPALNY

INALDIN Gardlo MAX, 1 mg/ml, 100 ml. Instrukcja dawkowania: 1-2 tabletki 3-4 razy dziennie. **INALDIN Gardlo MAX**, 1 mg/ml, 100 ml. Instrukcja dawkowania: 1-2 tabletki 3-4 razy dziennie. **INALDIN Gardlo MAX**, 1 mg/ml, 100 ml. Instrukcja dawkowania: 1-2 tabletki 3-4 razy dziennie.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

INALDIN Gardlo MAX

od 2 do 4 dawek
każdorazowo

2-6 razy
na dobę

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.