

Intesta Max, granulat, 30 saszetek



Cena: 42,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 saszetek
Postać	granulat
Producent	BIOLEK SP. Z O.O.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu

Opis

Intesta Max, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci granulatu. Produkt przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w chorobach i zaburzeniach funkcjonowania jelit, takich jak: zespół jelita nadwrażliwego (IBS), biegunki i zaburzenia jelitowe wywołane między innymi antybiotykoterapią, radioterapią, chemioterapią lub patogenami, zaburzenia spowodowane zabiegami chirurgicznymi w obrębie jelit, choroby zapalne jelit, choroba uchyłkowa jelit. Substancją aktywną w produkcie jest maślan sodu w specjalnie opracowanej matrycy trójglicerydowej, która chroni składnik odżywczy przed wchłonięciem w żołądku i pomaga w dostarczeniu go do jelita grubego. Matrycę stanowią odpowiednio dobrane, całkowicie uwodornione trójglicerydy kwasów tłuszczowych z oleju palmowego (technologia mikrootoczkowania MSB, ang. Microencapsulated sodium butyrate). Granulat w saszetce jest nierozpuszczalny w wodzie i posiada dodatek naturalnego aromatu żurawinowego.

Zastosowanie

Do postępowania dietetycznego:

- w zaburzeniach flory jelitowej,
- w zaburzeniach czynności jelit,
- w chorobach zapalnych błony śluzowej jelit,
- w zakażeniach jelit i bieguncie.

Zalecane spożycie

- Dorośli: 1 saszетка dziennie, rano po śniadaniu.
- Granulat z saszetki zaleca się wsypać bezpośrednio do ust i popić wodą o temperaturze pokojowej lub zmieszać z gęstym posiłkiem, np. jogurtem lub serkiem i spożyć bezpośrednio po otwarciu saszetki.
- Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) i inne zaburzenia czynnościowe jelit: zaleca się przyjmować 1 saszetkę rano po śniadaniu do momentu uzyskania pozytywnego efektu dietetycznego, nie krócej niż jeden miesiąc. Jeśli w tym okresie nie zostanie uzyskany pozytywny efekt dietetyczny, postępowanie z użyciem preparatu można kontynuować aż do jego osiągnięcia dalsze postępowanie, w celu utrzymania osiągniętego efektu dietetycznego, można kontynuować z użyciem preparatu Intesta w kapsułkach, który zawiera mniejszą porcję maślanu sodu.

- Biegunki i zaburzenia jelitowe wywołane między innymi przez antybiotykoterapię, radioterapię, chemioterapię lub patogeny: zaleca się przyjmować 1 saszetkę rano po śniadaniu do momentu uzyskania pozytywnego efektu dietetycznego, nie krócej niż jeden miesiąc. Jeśli w tym okresie nie zostanie uzyskany pozytywny efekt dietetyczny, postępowanie z użyciem preparatu można kontynuować aż do jego osiągnięcia, dalsze postępowanie, w celu utrzymania osiągniętego efektu dietetycznego, można kontynuować z użyciem preparatu Intesta w kapsułkach, który zawiera mniejszą porcję maślanu sodu.
- Stosowanie przed i po zabiegu chirurgicznym w obrębie jelit: zaleca się przyjmować 1 saszetkę rano po śniadaniu lub 1 saszetkę rano po śniadaniu i 1 saszetkę wieczorem po kolacji, przez około 10-14 dni przed operacją. Zaleca się przyjmować 1 saszetkę rano po śniadaniu lub 1 saszetkę rano po śniadaniu i 1 saszetkę wieczorem po kolacji, przez około 2 tygodnie po operacji.
- Nieswoiste choroby zapalne jelit oraz choroba uchyłkowa jelit: zaleca się przyjmować 1 saszetkę rano po śniadaniu.

Skład

Mieszanina całkowicie uwodornionych trójglicerydów kwasów tłuszczowych z oleju palmowego, maślan sodu, aromat naturalny żurawinowy, substancja słodząca: acesulfam K.

- 100 g produktu zawiera: wartość energetyczna 2836 kJ/ 688 kcal, tłuszcz 70 g, w tym kwasy tłuszczowe 70 g; węglowodany 14 g, w tym cukry 0 g; białko 0,5 g, sól 16,2 g, w tym sól 6,5 g, maślan sodu 30 g.
- 1 saszetka zawiera: wartość energetyczna 71 kJ/ 17 kcal, tłuszcz 1,75 g, w tym kwasy tłuszczowe 1,75 g; węglowodany <0,5 g, w tym cukry 0 g; białko <0,5 g; sól 0,4 g, w tym sól 0,16 g, maślan sodu 0,75 g.
- 2 saszetki zawierają: wartość energetyczna 142 kJ/ 34 kcal, tłuszcz 3,5 g, w tym kwasy tłuszczowe 3,5 g; węglowodany <0,5 g, w tym cukry 0 g; białko <0,5 g; sól 0,8 g, w tym sól 0,32 g, maślan sodu 1,5 g.

Przechowywanie

- W temperaturze do 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Chronić przed światłem i wilgocią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
- Nie stosować u osób, u których nie stwierdzono wymienionych stanów chorobowych, zaburzeń stanu zdrowia lub brak jest wskazań lekarskich do jego stosowania.
- Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zalecanego spożycia i sposobu użycia zamieszczonymi na opakowaniu oraz w ulotce.
- Lekarz może zalecić okres przyjmowania oraz porcję preparatu indywidualnie dopasowane do potrzeb dietetycznych.
- Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.
- Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Dodatkowe informacje

Intesta Max zawiera substancję słodzącą (acesulfam K).