

inVag, żel, na zakażenia okolic intymnych, 30 g



Cena: 35,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 g
Postać	żel
Producent	IBSS BIOMED S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

inVag, żel, to specjalistyczny wyrób medyczny dla kobiet podatnych na zakażenia okolic intymnych w celu wspomaganie leczenia i łagodzenia skutków zakażeń. Żel ten zmniejsza uczucie pieczenia i dyskomfortu, łagodzi podrażnienia i inne dolegliwości związane ze stanem zapalnym okolic intymnych, pielęgnuje i nawilża.

Składniki utrzymują fizjologiczne, kwaśne pH dzięki czemu chronią równowagę mikrobiologiczną okolic intymnych. inVag działa przeciwgrzybiczo ograniczając wzrost *Candida albicans*, *Candida glabrata*, a także przeciwbakteryjnie wobec drobnoustrojów najczęściej wywołujących stany zapalne pochwy, takich jak: *Gardnerella vaginalis*, *Escherichia coli*, *Prevotella bivia*, *Streptococcus agalactiae*.

Żel jest komfortowy w użyciu, nie brudzi bielizny, a specjalna konsystencja zapewnia przyjemne i długotrwałe nawilżenie.

Zastosowanie

Do stosowania:

Codziennego lub doraźnie w celu:

- wspomaganie leczenia bakteryjnych i grzybiczych zakażeń okolic intymnych,
- utrzymania równowagi mikrobiomu okolic intymnych,
- łagodzenia objawów zakażenia bakteryjnego lub grzybiczego, takich jak pieczenie, świąd i dyskomfort w obrębie zewnętrznych narządów płciowych,
- utrzymania fizjologicznego, kwaśnego pH okolic intymnych, które hamuje nadmierny wzrost bakterii i grzybów

Profilaktycznie:

- w stanach zwiększonego ryzyka wystąpienia stanów zapalnych okolic intymnych, a zwłaszcza:

- przy skłonności do nawracających infekcji okolic intymnych,
- w trakcie i po kuracji antybiotykowej (doustnej lub dopochwowej),
- w sytuacjach utrudnionej higieny, np. podczas podróży,

- przy częstym korzystaniu z basenu, jacuzzi, sauny,
- w okresie klimakterium, po połogu, w cukrzycy.

Sposób użycia

- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Na okolice krocza i zewnętrznych narządów płciowych nałożyć cienką warstwę żelu. Nakładać od przodu w kierunku odbytu.
- Zazwyczaj wystarczy jedna aplikacja żelu raz na dobę. W razie potrzeby żel można stosować 2 – 3 razy dziennie.
- Nacisnąć pompkę wielokrotnie w celu rozpoczęcia właściwego dozowania żelu.

Skład

Składniki aktywne: metabolity bakterii *Lactobacillus* (supernatant probiotyczny), które naturalnie chronią okolice intymne przed niekorzystnymi drobnoustrojami. Składniki pomocnicze: woda, glikol propylenowy, gliceryna, hydroksypropylometylceluloza, alkohol feniloetylowy, glikol kaprylowy, kompozycja zapachowa.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze od 15°C do 25°C w suchym miejscu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Jeśli po zastosowaniu Invag żel pojawią się jakiegokolwiek niepokojące objawy, tj. nasilenie świądu, nasilenie pieczenia, wysypka itp. należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku ostrych infekcji pochwy zalecane jest stosowanie pod nadzorem lekarza.
- Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu oraz w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Po zastosowaniu żelu może wystąpić chwilowe delikatne szczypanie, co jest związane z prawidłową reakcją na obniżenie pH.

Dodatkowe informacje

- Produkt testowany dermatologicznie u osób z dodatnim wywiadem w kierunku alergii.
- Produkt testowany ginekologicznie.
- Nie zawiera PEG, parabenów, detergentów w tym: SLS, SLES.