

# Iwostin Purritin SPF50+, krem koloryzujący BB do skóry tłustej, 30 ml



Cena: 42,95 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 ml
Opakowanie	30 ml
Postać	krem
Producent	SANOFI POLSKA SP.Z O.O.
Rejestracja	kosmetyk

## Opis produktu

### Opis produktu

Iwostin Purritin, krem BB SPF 50+ dedykowany specjalnym potrzebom skóry tłustej i trądzikowej. Produkt działa kompleksowo, nie tylko zastępując użycie podkładu, ale również kremu z filtrem. Krem BB chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, zmniejszając nadprodukcję sebum. Nie zatyka też porów, przez co niweluje powstawanie nowych zmian trądzikowych. Iwostin Purritin krem BB ma wysoki stopień tolerancji dla skóry, jest fotostabilny i nie przyczynia się do powstawania zaskórników. Może być stosowany w codziennej pielęgnacji, a także po zabiegach kosmetycznych. Produkt został przebadany dermatologicznie.

### Zastosowanie

Krem dla cery trądzikowej i tłustej przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry. Może być wykorzystywany również w przypadku cery mieszanej.

### Składniki

Aqua, Dicaprylyl Carbonate, C12-15 Alkyl Benzoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Titanium Dioxide, Glycerin, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Potassium Cetyl Phosphate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano), Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Polydecene, VP/Eicosene Copolymer, Cetearyl Alcohol, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Phenoxyethanol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isononyl Isononanoate, Squalane, Hydroxystearic Acid, Tocopheryl Acetate, Decyl Glucoside, Panthenol, Dimethicone, Sodium PCA, Disodium EDTA, Polysorbate 60, Ethylhexylglycerin, Laminaria Ochroleuca Extract, Parfum, Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer, Triethoxycaprylylsilane, Sorbitan Oleate, Sorbitan Isostearate, Magnesium PCA, PEG-8, Zinc PCA, Propylene Glycol, Tocopherol, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Pantolactone, Manganese PCA, Ascorbyl Palmitate, BHT, Potassium Sorbate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Alumina, Magnesium Oxide, CI 77492, CI 77491, CI 77499

### Sposób użycia

Stosować codziennie rano na oczyszczoną skórę twarzy. Ważne, by preparat nakładać równomiernie, na co najmniej 15 minut przed ekspozycją na słońce. Aplikację kremu BB można powtórzyć w przypadku długotrwałego przebywania na słońcu lub wtedy, gdy zostanie

starty z powierzchni skóry.