

Kadefarm Femimed Gel żel dopochwowy, 50 ml



Cena: 21,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50 ml
Postać	żel dopochwowy
Producent	GOFARM SP. Z O.O. S.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Opis produktu

Kadefarm Femimed Gel to wyrób medyczny w formie nawilżającego żelu intymnego. Przeznaczony jest do nawilżania i regulacji pH okolic intymnych błony śluzowej pochwy. Dzięki zastosowaniu kwasu hialuronowego tworzy na powierzchni żelową powłokę ochronną, poprzez wiązanie się z wilgotną wydzieliną błon śluzowych pochwy. Kwas mlekowy utrzymuje równowagę mikrobiologiczną i zapobiega przedostawaniu się bakterii chorobotwórczych.

Dzięki zachowaniu odpowiedniego nawilżenia okolic intymnych wytwarzane jest odpowiednie środowisko dla zachowania równowagi pH i naturalnych procesów regeneracji.

Femimed Kadefarm Gel to bezbarwny i bezzapachowy żel dopochwowy. Łagodzi objawy atrofii pochwy takie jak: pieczenie, świąd, zaczerwienienie, nieprawidłowa wydzielina, obrzęk, dyskomfort podczas współżycia płciowego i uczucie napięcia tkanek.

Zastosowanie

Żel intymny przeznaczony do regulacji pH, nawilżenia oraz utrzymania odpowiedniego środowiska błony śluzowej pochwy i okolic intymnych. Ułatwia stosunki płciowe w przypadku suchości pochwy.

Sposób użycia

- W celu zastosowania żelu dopochwowo należy nałożyć na tubę nasadkę aplikatora, a następnie lekko przyciskając zaciągnąć aplikator aż wypełni się całkowicie żelem.
- Umieścić końcówkę aplikatora w pochwie i wycisnąć zawartość żelu z aplikatora.
- Po użyciu dokładnie umyć aplikator.
- Stosować 1 aplikację dziennie, na noc lub przed planowanym współżyciem.

Składniki

Sól sodowa kwasu hialuronowego, kwas mlekowy, gliceryna, hydroksyetyloceluloza, metylparaben, propylparaben, woda.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników żelu.

- Przewlekłe i ostre stany zapalne, objawiające się wydzieliną ropną lub nadmierną wydzieliną śluzową, wymagające porady lekarza ginekologa.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.