

Lefrosch Squamax, balsam do mycia, 200 ml



Cena: 42,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	200 ml
Opakowanie	200 ml
Postać	balsam
Producent	LEFROSCH SP. Z O.O.
Rejestracja	kosmetyk
Wiek	od 3 roku życia

Opis produktu

Opis produktu

Lefrosch Squamax, balsam do mycia, to nowoczesny preparat pielęgnacyjny przeznaczony do mycia skóry dotkniętej problemem łuszczycy, wyprysku (egzemy) w tym wyprysku atopowego, rybiej łuski i suchości. Przeznaczony jest do mycia całego ciała lub okolic zajętych procesem chorobowym. Formuła preparatu oparta na oleju słonecznikowym zapewnia głębokie nawilżenie oraz zmiękczenie warstw suchego i zrogowaciałego naskórka. Komfortowo aplikowane w trakcie mycia substancje lipidowe hamują stan zapalny, zmniejszają uczucie świądu i pieczenia oraz zwiększają przenikanie leków stosowanych miejscowo.

Zastosowanie

Pielęgnacja skóry z problemem: łuszczycy, wyprysku (egzemy), rybiej łuski, atopowego zapalenia skóry, suchości skóry, świądu skóry.

Sposób użycia

- Nanieść na zwilżoną skórę i rozprowadzić po jej powierzchni.
- Po umyciu spłukać wodą.
- Skórę delikatnie osuszyć ręcznikiem unikając pocierania.

Dodatkowe informacje

- Tylko do użytku zewnętrznego.
- W razie przypadkowego połknięcia preparatu natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Przed pierwszym użyciem, należy zastosować na niewielkiej powierzchni skóry w celu wykluczenia ewentualnej nadwrażliwości.
- W razie pojawienia się objawów uczulenia lub nadwrażliwości na składniki preparatu, takich jak świąd, rumień, obrzęk skóry, natychmiast zaprzestać stosowania preparatu i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
- Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, tj. od 15oC do od 25oC.
- Po otwarciu zużyć w przeciągu 3 miesięcy.

- Przeciwwskazania do stosowania: wiek poniżej 3 roku życia, nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu, nie stosować w przypadku zakażenia bakteryjnego, grzybiczego lub wirusowych skóry.