

Lioton 1000 8,5 mg/g, żel, 30 g

Cena: 28,49 zł



Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 g
Dawka	8,5 mg/g
Opakowanie	30 g
Postać	żel
Producent	A.MENARINI INDUSTRIE PHARMACEUTICHE RIUNITE S.R.I.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Heparinum natricum

Opis produktu

Opis

Lek Lioton 1000 w postaci żelu do stosowania na skórę; zawiera heparynę, wykazuje działanie miejscowe przeciwzakrzepowe, przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.

Wskazania

Wspomagająco w leczeniu chorób żył powierzchownych takich, jak: zakrzepowym zapaleniu żył, zapalenia żył, żylakach kończyn dolnych; krwiakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach.

Działanie

- Przeciwzakrzepowe,
- Przeciwobrzękowe,
- Przeciwzapalne.

Dawkowanie

- Stosować na skórę.
- 1 do 3 razy na dobę nakładając pasek żelu o długości 3-10 cm na powierzchnię skóry i delikatnie masując aż do wchłonięcia żelu.
- W przypadku obrzęków po urazach zaleca się stosowanie leku przez okres do 10 dni, a w przypadku leczenia chorób żył powierzchownych przez 1 do 2 tygodni.

Skład

1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) heparyny sodowej (Heparinum natricum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na heparynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu leczniczego.
- Ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu jako substancji pomocniczych, nie należy stosować produktu leczniczego u osób z alergią na parabeny.
- Nie należy stosować na otwarte rany lub sączące się zmiany skórne. Nie stosować w okolicy oczu, nosa i ust.
- Nie należy stosować w przypadku krwawienia.
- Nie wolno przyjmować doustnie.

Działania niepożądane

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy reakcji alergicznych (zaczerwienienie i świąd skóry) lub objawy reakcji pseudoalergicznyc. W takich przypadkach leczenie należy przerwać. U niektórych pacjentów, u których pierwotnie występuje czerwienica prawdziwa, po podaniu miejscowym heparyny w żelu mogą pojawić się zmiany skórne.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25oC.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.