

Lirra Gem 5 mg, 7 tabletek powlekanych



Cena: 9,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	5 mg
Opakowanie	7 tabletek powlekanych
Producent	GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Levocetirizini dihydrochloridum

Opis produktu

Wskazania

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (w tym przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa), pokrzywka u dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat.

Działanie

Przeciwalergiczne.

Dawkowanie

- Raz na dobę 1 tabletki.
- Lek połykać w całości, popijając wodą, niezależnie od posiłku.
- Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.
- U dzieci dawkę należy także dostosować do masy ciała. Dawkę leku ustali lekarz.
- U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki leku w zależności od stopnia zaawansowania choroby nerek.
- Pacjenci, u których występują wyłącznie zaburzenia czynności wątroby, powinni przyjmować zwykle stosowaną dawkę leku.
- U pacjentów, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i nerek, może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki leku w zależności od stopnia zaawansowania choroby nerek.

Skład

Substancja czynna zawarta w 1 tabletki: lewocetyryzyny dichlorowodorek 5 mg,
substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
- Rzadko występująca dziedziczna nietolerancja galaktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp).
- Ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

- Cięża i okres karmienia piersią: zaleca się unikanie stosowania leku.

Działania niepożądane

- Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 pacjentów na 100): suchość w jamie ustnej, bóle głowy, uczucie zmęczenia, senność.
- Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 pacjentów na 1 000): uczucie wyczerpania, bóle brzucha.
- Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): kołatanie serca, drgawki, mrowienie, zawroty głowy, omdlenia, drżenie, zaburzenia odczuwania smaku, uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego), zaburzenia widzenia (takie jak niewyraźne widzenie), bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego, obrzęk (zatrzymanie wody powodujące obrzęk), duszność, świąd (swędzenie), wysypka i pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i swędzenie skóry), wyprysk (wykwity) skórny, zwiększenie masy ciała, bóle mięśni, agresywne zachowanie lub pobudzenie, bezsenność, nawracające myśli samobójcze, zapalenie wątroby lub zaburzenia czynności wątroby (skóra lub białkówki oczu mogą stać się żółte), zwiększenie apetytu, nudności.
- Do objawów nadwrażliwości mogą należeć: obrzęk ust, języka, twarzy i (lub) gardła, trudności w oddychaniu i przełykaniu, którym towarzyszy pokrzywka (obrzęk naczynioruchowy), nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi prowadzące do zapaści (omdlenie) lub wstrząsu, które mogą prowadzić do śmierci.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się podawania leku Lirra Gem dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.