

Lix krople do uszu, roztwór, 7 g



Cena: 28,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	7 g
Postać	krople do uszu, roztwór
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Wiek	od 6 miesięcy

Opis produktu

Opis

Wyrób medyczny LIX zmiękcza woskowinę, pomaga w jej usunięciu oraz dzięki swoim właściwościom wiążącym wodę usuwa nadmiar płynu z tkanek przewodu słuchowego (działanie osmotyczne) prowadząc tym samym do zniesienia dolegliwości występujących w stanach zapalnych ucha takich jak ból ucha czy obrzęk. Glicerol wykazuje działanie przyczynowe. Lidokaina zastosowana pomocniczo w kroplach LIX jako środek powierzchniowo znieczulający, nasila to działanie i dodatkowo łagodzi ból ucha. Może być stosowany u dzieci od 6 miesiąca życia.

Zastosowanie

Wspomagająco przy:

- dolegliwościach, którym towarzyszy ból spowodowany długotrwałym noszeniem słuchawek lub woskowiną, która zatyka przewód słuchowy zewnętrzny,
- stanach zapalnych objawiających się obrzękiem, bólem i swędzeniem przewodu słuchowego zewnętrznego,
- dolegliwościach, którym towarzyszy ból spowodowany regularną ekspozycją na działanie wody i wilgoci, np. basen,
- dolegliwościach, którym towarzyszy ból spowodowany częstym stosowaniem detergentów, które niszczą naturalną błonę osłaniającą przewód słuchowy zewnętrzny, np. szampony, mydła, żele.

Sposób użycia

- Do użytku zewnętrznego.
- Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 krople do każdego ucha maksymalnie trzy razy na dobę. Jeśli po upływie 3 dni nie dojdzie do poprawy lub pacjent czuje się

gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

- Dzieci od 6 miesiąca życia: 2 krople do każdego ucha maksymalnie trzy razy na dobę.
- Stosować wyłącznie pod nadzorem dorosłych i lekarza.

- Jeśli po upływie 3 dni nie dojdzie do poprawy lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku zastosowania u dzieci konieczne jest zabezpieczenie ucha watą.
- Powodzenie leczenia powinien kontrolować lekarz.

Skład

0,5% roztwór chlorowodorku lidokainy w glicerolu (bezwodnym).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Krople nie mogą być stosowane u dzieci poniżej 6 miesiąca życia.

Dodatkowe informacje

- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Po pierwszym otwarciu opakowania Lix można stosować przez 4 tygodnie.