

Loperamide Aurovitas 2 mg, 20 kapsułek



Cena: 11,25 zł

Opis słownikowy

Dawka	2 mg
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	kapsułki twarde
Producent	AUROVITAS PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Loperamidum
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

Loperamide Aurovitas jest lekiem zawierającym substancję czynną: loperamid, w dawce 20 mg. Lek ten jest stosowany w leczeniu nagłych, krótkotrwałych (ostrych) ataków biegunki u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Działanie

Loperamid pomaga zatrzymać biegunkę, powodując, że stolec jest bardziej zwarty oraz zmniejsza się częstość wypróżnień.

Dawkowanie

Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- Po pierwszym luźnym stolcu (wypróżnieniu) należy wziąć 2 kapsułki i popić wodą.
- Po każdym kolejnym luźnym stolcu należy wziąć 1 kapsułkę.
- Nie należy zażywać więcej niż 6 kapsułek w ciągu 24 godzin.

Skład

Substancją czynną jest loperamidu chlorowodorek. Każda kapsułka, twarda zawiera 2 mg loperamidu chlorowodoru. Pozostałe składniki: Zawartość kapsułki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian; osłonka kapsułki: tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna; tusz: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172).

Przeciwwskazania

Nie stosować leku:

- Jeśli pacjent jest uczulony na loperamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nadwrażliwość można rozpoznać na przykład po wystąpieniu wysypki skórnej, swędzenia, ucisku w klatce piersiowej lub opuchniętej twarzy.
- Jeśli pacjent ma rozdęcie okrężnicy (silnie rozszerzoną okrężnicę), ostre rozdęcie okrężnicy (ostre toksyczne zapalenie okrężnicy z rozszerzeniem okrężnicy) i niedrożność jelit, poważna sytuacja, która może wystąpić u pacjentów z chorobą Hirschsprunga, chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, z powodu bardzo bolesnego wzdęcia brzucha,

gorączki i przyspieszonego bicia serca.

- Jeśli pacjent cierpi na niedrożność jelit, która powoduje "wyciek" wodnistych stolców.
- Jeśli u pacjenta występuje uporczywy ból brzucha, wysoka temperatura i (lub) stolce zawierają śluz i (lub) krew.
- Jeśli u pacjenta występuje bakteryjne zapalenie jelita grubego i (lub) jelita cienkiego wywołane przez organizmy inwazyjne, w tym Salmonella, Shigella i Campylobacter.
- Jeśli u pacjenta występuje ciężkie zapalenie jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego wywołane stosowaniem niektórych antybiotyków).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Loperamidu należy unikać w pierwszym trymestrze ciąży; może być jednak stosowany w drugim i trzecim trymestrze ciąży.