

Maalox (35 mg + 40 mg)/ ml, zawiesina doustna, 250 ml



Cena: 21,59 zł

Opis słownikowy

Dawka	(35 mg + 40 mg)/ ml
Opakowanie	250 ml
Postać	zawiesina doustna
Producent	SANOFI AVENTIS FRANCE
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Aluminium hydroxidum, Magnesium hydroxide

Opis produktu

Wskazania

- W leczeniu objawowym zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, związanych z nadkwaśnością: nieżyt żołądka, zarzucanie wsteczne treści żołądka do przełyku w przebiegu przepukliny roztworu przełykowego przepony, niestrawność, zgaga z powodu nadkwaśności,
- Pomocniczo w leczeniu: choroby wrzodowej żołądka, choroby wrzodowej dwunastnicy.

Działanie

Lek złożony, o miejscowym działaniu zobojętniającym nadmiar kwasu solnego soku żołądkowego, ściągającym i osłaniającym błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. Nie powoduje nadmiernego zobojętnienia treści żołądka i wtórnego pobudzenia wydzielania kwasu.

Dawkowanie

- Zwykle stosowana dawka: 1 łyżka stołowa (10 ml) około 90 minut po posiłku lub w czasie bólu.
- Dawka maksymalna: 140 ml/dobę.
- Przed użyciem wstrząsnąć.

Skład

- Substancje czynne: glinu wodorotlenek, magnezu wodorotlenek.
- Substancje pomocnicze: kwas solny rozcieńczony, kwas cytrynowy bezwodny, olejek miętowy, mannitol, bromek domifenu, sacharyna sodowa, sorbitol 70 %, nadtlenek wodoru 30 %, woda oczyszczona.
- 100 ml zawiesiny zawiera 3,5 g glinu wodorotlenku i 4,0 g magnezu wodorotlenku.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na glinu wodorotlenek, magnezu wodorotlenek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

- Ciężka niewydolność nerek.

Działania niepożądane

- Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób): biegunki lub zaparcia.
- Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): mogą wystąpić nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca.
- Częstość występowania nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne, hipermagnezemia (zwiększenie stężenia magnezu w surowicy krwi), hiperaluminemia (zwiększona zawartość glinu w tkankach organizmu), hipofosfatemia (obniżenie stężenia fosforanów nieorganicznych w surowicy krwi).

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C,
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci,
- Należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego otwarcia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek:

- U dzieci poniżej 6 lat lek podawać po konsultacji z lekarzem,
- U pacjentów w podeszłym wieku,
- U pacjentów z niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie,
- Przy stosowaniu leku dłużej niż 2 tygodnie lub u pacjentów z ryzykiem hipofosfatemii (obniżone stężenie fosforanów nieorganicznych w surowicy krwi) zalecana jest konsultacja z lekarzem,
- U małych dzieci stosowanie wodorotlenku magnezu może prowadzić do wystąpienia hipermagnezemii, zwłaszcza jeśli stwierdza się u nich zaburzenie czynności nerek lub odwodnienie.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.