

Maalox 400 mg + 400 mg, 40 tabletek

Cena: 20,95 zł



Opis słownikowy

Dawka	400 mg + 400 mg
Opakowanie	40 tabletek
Postać	tabletki
Producent	SANOFI AVENTIS FRANCE
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Aluminium hydroxidum, Magnesium hydroxide

Opis produktu

Wskazania

W leczeniu objawowym zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, związanych z nadkwaśnością:

- nieżyt żołądka,
- zarzucanie wsteczne treści żołądka do przełyku w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego przepony,
- niestrawność, zgaga z powodu nadkwaśności,

Oraz pomocniczo w leczeniu:

- choroby wrzodowej dwunastnicy,
- choroby wrzodowej żołądka.

Działanie

Lek o miejscowym działaniu zobojętniającym nadmiar kwasu solnego soku żołądkowego, ściągającym i osłaniającym błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. Nie powoduje nadmiernego zobojętnienia treści żołądka i wtórnego pobudzenia wydzielania kwasu.

Dawkowanie

- Stosować po posiłku.
- 1-2 tabletki należy ssać lub żuć po posiłku lub w czasie bólu.

Skład

1 tabletkę zawiera: Substancje czynne: Glinu wodorotlenek 400 mg, Magnezu wodorotlenek 400 mg, Substancje pomocnicze: m. in. sacharoza, sorbitol, mannitol, Wskazówka dla pacjentów chorych na cukrzycę: 1 tabletkę zawiera 150 mg sacharozy.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na glinu wodorotlenek, magnezu wodorotlenek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

Działania niepożądane

- Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób): biegunki lub zaparcia.
- Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): mogą wystąpić nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca.
- Częstość występowania nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne, hipermagnezemia (zwiększenie stężenia magnezu w surowicy krwi), hiperaluminemia (zwiększona zawartość glinu w tkankach organizmu), hipofosfatemia (obniżenie stężenia fosforanów nieorganicznych w surowicy krwi).

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25oC.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Maalox:

- u pacjentów z niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie,
- u dzieci poniżej 6 lat lek podawać po konsultacji z lekarzem,
- u pacjentów w podeszłym wieku,
- przy stosowaniu leku dłużej niż 2 tygodnie lub u pacjentów z ryzykiem hipofosfatemii (obniżone stężenie fosforanów nieorganicznych w surowicy krwi) zalecana jest konsultacja z lekarzem.
- Lek zawiera sacharozę i sorbitol.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.