


# Maglek B6 51 mg + 5 mg, 50 tabletek



Cena: 12,99 zł

## Opis słownikowy

Dawka	51 mg + 5 mg
Opakowanie	50 tabletek
Postać	tabletki
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Magnesium lactate, Pyridoxini hydrochloridum

## Opis produktu

### Opis

Maglek B6, lek w postaci tabletek zawierającym mleczan magnezu oraz witaminę B6. Magnez występuje w postaci soli łatwo przyswajalnej przez organizm. Magnez współdziała z jonami wapnia w tworzeniu struktury kości. Witamina B6 pirydoksyna zwiększa o około 40% efektywność wchłaniania magnezu z przewodu pokarmowego do osocza.

### Wskazania

- Uzupełnienie stwierdzonych niedoborów magnezu oraz witaminy B6 w organizmie oraz profilaktyka niedoborów i powikłań związanych z tymi niedoborami,
- Profilaktycznie: w sytuacjach powodujących niedobory magnezu: stany przewlekłego przemęczenia fizycznego i psychicznego, błędy żywieniowe (spożywanie dużej ilości przetworzonej żywności) oraz stosowanie diet odchudzających, spożywanie dużej ilości kawy, nałogowe palenie tytoniu i spożywanie alkoholu; długotrwałe stosowanie leków przeczyszczających, środków antykoncepcyjnych i niektórych preparatów moczopędnych oraz diureza osmotyczna u chorych na cukrzycę w przebiegu przewlekłej hiperglikemii, choroby przewlekłe powodujące upośledzenie wchłaniania (zespoły złego wchłaniania); w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca,
- Wspomagająco po konsultacji z lekarzem jako uzupełnienie leczenia: chorób serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca; atonicznych skurczów mięśni i drętwienia kończyn; w stanach depresji nerwowej; podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy.

### Działanie

Uzupełnienie diety w magnez i witaminę B6.

### Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia, w profilaktyce - 1 do 2 tabletek na dobę.

### Skład

1 tabletkę zawiera 500 mg mleczanu magnezu (51mg Mg<sup>2+</sup>) i 5mg witaminy B6.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kroscarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

#### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- Hipermagnezemia o różnej etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo - komorowy serca, znaczne niedociśnienie tętnicze, myastheniagravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka.

#### Działania niepożądane

- Sporadycznie mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
- Długotrwałe systematyczne przyjmowanie witaminy B6 w dawce 50 mg/dobę może stać się przyczyną obwodowej neuropatii czuciowej, natomiast dawki dobowe przekraczające 200 mg na dobę mogą prowadzić do niedoboru kwasu foliowego, zaburzeń oddechowych oraz różnego rodzaju dermatoz.

#### Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.