

Magnefar B6 Forte, 60 tabletek powlekanych



Cena: 26,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	100 mg + 10,10 mg
Opakowanie	60 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Magnesii citras, Pyridoxini hydrochloridum
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Opis

Magnefar B6 Forte, lek w postaci tabletek powlekanych do stosowania u dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat i powyżej zawiera jony magnezowe oraz chlorowodorek pirydoxyny (witaminę B6). Magnez jest kationem niezbędnym do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Jego biologiczna rola polega na aktywacji szeregu enzymów. Odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego oraz wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Magnez wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym stopień wchłaniania zależy od zawartości w pokarmach. Niedobór magnezu może powodować zaburzenia ze strony układu mięśniowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Wskazania

Leczenie i profilaktyka niedoboru magnezu.

Działanie

Uzupełnienie niedoborów magnezu.

Dawkowanie

- Dorośli: 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku.
- Dzieci i młodzież: 6 - 14 lat, 21 - 30 kg: 1 do 2 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku,
- Dzieci i młodzież: 6 - 14 lat, 31 - 39 kg 2 do 3 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku,
- 14 - 18 lat \geq 40 kg: 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku.

Skład

- Substancjami czynnymi leków są magnezu cytrynian i pirydoxyny chlorowodorek (witamina B6).
- Jedna tabletki powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 10,10 mg pirydoxyny chlorowodoru (Pyridoxini hydrochloridum).
- Rdzeń tabletki: celuloza mikrokryształiczna, krospowidon (typ A), kroscarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna,

magnezu stearynian.

- Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), glicerolu monokaprylokapronian (typ 1), sodu laurylosiarczan.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Jeśli u pacjenta stwierdzono hipermagnezemię (zwiększone stężenie magnezu we krwi);
- Ostra niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min.);
- Jeśli u pacjenta stwierdzono znaczne niedociśnienie tętnicze;
- Jeśli u pacjenta stwierdzono blok przedsionkowo-komorowy;
- Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę zwaną myasthenia gravis (nabyta, przewlekła choroba, charakteryzująca się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni szkieletowych).

Działania niepożądane

- Rzadko: bóle brzucha, luźne stolce lub biegunka na początku leczenia (zwykle o małym nasileniu i przemijające); zaczerwienienie skóry.
- Bardzo rzadko: reakcje alergiczne.

Przechowywanie

- W temperaturze powyżej 30°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat i o masie ciała poniżej 20 kg.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.