

Magnezin 500 mg, 60 tabletek



Cena: 19,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,13 g Mg ²⁺
Opakowanie	60 tabletek
Postać	tabletki
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Magnesii subcarbonas ponderosus

Opis produktu

Opis

Magnezin, lek w postaci tabletek zawierający magnez (130 mg jonów magnezowych). Magnez jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu (do działania wielu enzymów, procesu mineralizacji tkanki kostnej, skurczy mięśni, prawidłowej pracy serca).

Wskazania

- Leczniczco: zaburzenia rytmu serca (leczenie wspomagające); niewydolność serca z towarzyszącymi komorowymi zaburzeniami rytmu (leczenie wspomagające); skurcze mięśni i drętwienie kończyn; bóle mięśni; przewlekłe zmęczenie; nadmierna pobudliwość nerwowa; zaburzenia snu.
- Profilaktycznie: w okresie długotrwałego stosowania niektórych leków moczopędnych; w okresie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych; podczas kuracji odchudzających; w okresie wzmożonego wysiłku fizycznego.

Działanie

Uzupełnienie niedoboru magnezu.

Dawkowanie

- Profilaktycznie: 600 mg (3 tabletki po 200 mg) na dobę,
- Leczniczco: dawkę ustala się indywidualnie w zależności od wskazań i zapotrzebowania na jony magnezowe.
- W celu uzupełnienia niedoborów magnezu zwykle stosuje się 1500 mg (3 tabletki po 500 mg) na dobę.
- Dawkę dobową zwykle dzieli się na 3 równe dawki jednorazowe.
- W celu odpowiedniego dostosowania dawki dostępny jest również lek Magnezin zawierający 52 mg jonów magnezowych w postaci 200 mg magnezu węglanu ciężkiego.
- Tabletkę należy połknąć w całości i popić wodą.
- Pojedyncze dawki najlepiej jest przyjąć w równych odstępach czasu w ciągu dnia.
- Nie należy stosować na czczo.

Skład

Substancja czynna: magnezu węglan ciężki.

1 tabletkę leku Magnezin zawiera 130 mg jonów magnezowych w postaci 500 mg magnezu węglań ciężkiego (Magnesii subcarbonas ponderosus).

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, sodu laurylosiarczan, alkohol poliwinylowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na węglan magnezu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Reakcja uczuleniowa może się objawiać wysypką, swędzeniem, spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem).

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.