

Magnokal Asparaginian, 50 tabletek



Cena: 14,31 zł

Opis słownikowy

Dawka	250 mg + 250 mg
Opakowanie	50 tabletek
Postać	tabletki
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Magnesii hydroaspartas, Kalii hydroaspartas

Opis produktu

Wskazania

- Jako leczenie wspomagające w chorobach układu krążenia i mięśnia sercowego. W niemiarowości i nadpobudliwości serca - szczególnie na tle niedoborów magnezu i potasu oraz w rekonwalescencji pozawałowej.
- Profilaktycznie i leczniczo w stanach niedoboru magnezu i potasu.
- W okresach zdrowienia po zabiegach chirurgicznych oraz przebytych chorobach zakaźnych.
- Zatrucie glikozydami nasercowymi, uzupełniająco w czasie stosowania leków moczopędnych.

Działanie

Magnokal Asparaginian jest lekiem o skojarzonym działaniu magnezu, potasu i kwasu asparaginowego. Uzupełnia niedobór tych substancji w organizmie oraz zapobiega rozwojowi ich deficytu zarówno w okresie zwiększonego zapotrzebowania, jak i w przypadku niedostatecznej ich podaży. Kwas asparaginowy bierze udział w metabolizmie komórek tkanki nerwowej, pełni rolę neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wpływa pobudzająco na aktywność organizmu. Potas i magnez są jonami biorącymi udział w wielu przemianach metabolicznych organizmu.

Dawkowanie

Lek stosuje się doustnie od 2 do 6 tabletek na dobę w dwóch dawkach podzielonych, po posiłkach.

Skład

Substancjami czynnymi leku są magnezu wodorasparaginian czterowodny i potasu wodorasparaginian półwodny. Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, powidon 25, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Ciężka niewydolność nerek
- Zwiększone stężenie potasu lub magnezu w surowicy krwi.

- Zakażenia dróg moczowych.
- Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok) serca.
- Zmniejszenie częstości akcji serca (bradykardia).
- Myasthenia gravis - choroba charakteryzująca się osłabieniem i zmęczeniem mięśni.
- Znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.

Działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności i biegunka), które zwykle ustępują samoistnie, metaliczny smak w ustach. Duże dawki leku mogą wywołać zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Może wystąpić zaczerwienienie skóry, bezsenność, osłabienie mięśniowe.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.