

# Magvit B6, 50 tabletek dojelitowych



Cena: 16,15 zł

## Opis słownikowy

Dawka	48 mg + 5 mg
Opakowanie	50 tabletek dojelitowych
Postać	tabletki dojelitowe
Producent	MEDAGRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Magnesium lactate, Pyridoxini hydrochloridum

## Opis produktu

### Opis

Magvit B6, lek w postaci tabletek dojelitowych, zawiera sól magnezową kwasu mlekowego oraz witaminę B6 (chlorowodrek pirydoksyny). Magnez reguluje przepływ jonów w komórce – zmniejsza pobudliwość nerwowo-mięśniową. Współdziała z jonami wapnia w tworzeniu struktury kości. Witamina B6 ułatwia wchłanianie i transport magnezu z przewodu pokarmowego do krwi, a następnie przez błony biologiczne do wnętrza komórek oraz zmniejsza ilość magnezu wydalanego z moczem, co pozwala na zabezpieczenie prawidłowej wewnątrzkomórkowej puli magnezu.

### Wskazania

- Profilaktyka powikłań związanych z niedoborem magnezu i/lub witaminy B oraz uzupełnienie stwierdzonych niedoborów tych związków w organizmie,
- Wspomagająco jako uzupełnienie leczenia chorób serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca; w terapii atonicznych skurczów mięśni i drętwienia kończyn, w stanach depresji nerwowej, a także podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy,
- Profilaktycznie w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, nadpobudliwości nerwowej, w sytuacjach wywołujących stres, depresjach, zaburzeniach snu, bólach mięśni, w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca,
- Uzupełniająco w hipomagnezemia wywołanej nałogowym paleniem tytoniu i spożywaniem alkoholu; długotrwałym stosowaniem leków przeczyszczających, środków antykoncepcyjnych i niektórych preparatów moczopędnych oraz diurezą osmotyczną u cukrzyków w przebiegu przewlekłej hiperglikemii.

### Działanie

Uzupełnienie niedoboru magnezu i witaminy B6.

### Dawkowanie

Profilaktycznie: dorośli i dzieci od 12. roku życia. (młodzież): 1 raz na dobę 2 tabletki lub 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę  
Lek należy popić wodą.

### Skład

1 tabletkę zawiera: 48 mg jonów magnezu w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego (Magnesii lactas) i 5 mg pirydoksyny

chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum).

#### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek składnik Magvit B ,
- Biegunka,
- Ciężka niewydolność nerek,
- Hipermagnezemia,
- Hiperwitaminoza B ,
- Blok przedsionkowo-komorowy,
- Myasthenia gravis,
- Parkinsonizm leczony L-dopą bez stosowania inhibitora obwodowej dekarboksylazy lewodopy,
- Znaczne niedociśnienie tętnicze,
- Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego.

#### Działania niepożądane

Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

#### Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.
- W oryginalnym opakowaniu.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.