

Maść na odciski (400 mg + 100 mg)/ g, 10 g



Cena: 8,50 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---|
| Dawka | (400 mg + 100 mg)/ g, |
| Opakowanie | 10 g |
| Postać | maść |
| Producent | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Acidum salicylicum, Acidum lacticum |

Opis produktu

Wskazania

Usuwanie odcisków.

Działanie

Działa keratolitycznie (złuszcząco), zmiękcza i rozpułchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie oraz działa miejscowo przeciwzapalnie.

Dawkowanie

- Stosować miejscowo na odciski.
- Odcisk wymoczyć i osuszyć. Nałożyć na odcisk cienką warstwę maści i zabezpieczyć plastrem lub bandażem. Stosować lek przez 4 do 6 dni rano i na noc, nie zmywając posmarowanych miejsc wodą. Następnie odcisk należy dobrze wymoczyć w gorącej wodzie i usunąć. Nie należy wycinać ani wyrywać odcisków.
- W razie braku efektów, powtórzyć leczenie po upływie 3 dni.

Skład

1 g maści zawiera: kwas salicylowy (Acidum salicylicum) 400 mg, kwas (S)-mlekowy (Acidum lacticum) 100 mg.

Przeciwwskazania

- W przypadku nadwrażliwości na substancje czynne (kwas salicylowy lub kwas mlekowy), albo na którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu,
- U pacjentów chorych na cukrzycę lub osób z zaburzeniami krążenia,
- Jeśli skóra w otoczeniu odcisku jest uszkodzona lub zmieniona zapalnie,
- U dzieci.

Działania niepożądane

Niekiedy może wystąpić miejscowe podrażnienie i objawy nadwrażliwości skóry.

Przechowywanie

- W temperaturze nie wyższej niż 25oC.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.