

Mastodynon, 60 tabletek



Cena: 49,35 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	60 tabletek
Postać	tabletki
Producent	BIONORICA AG
Rejestracja	Lek
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Opis

Mastodynon, lek homeopatyczny w postaci tabletek, przeznaczony dla kobiet, powyżej 18 roku życia. Stosowany wspomagająco w zespole napięcia przedmiesiączkowego z takimi objawami jak: mastodynia (bolesność piersi), zaburzenia równowagi emocjonalnej, po wykluczeniu przez lekarza poważnych przyczyn dolegliwości.

Wskazania

Wspomagająco w zespole napięcia przedmiesiączkowego z takimi objawami jak: mastodynia (bolesność piersi), zaburzenia równowagi emocjonalnej, po wykluczeniu przez lekarza poważnych przyczyn dolegliwości.

Działanie

Łagodzi objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Dawkowanie

- Dorosłe kobiety: dawka jednorazowa: 1 tabletkę, dawka dzienna: 2 razy dziennie po 1 tabletkę.
- Stosować doustnie, 1 tabletkę, popić np. szklanką wody.
- Lek należy przyjmować przez co najmniej 2-3 miesiące - także w trakcie menstruacji.
- Jeśli po 6 tygodniach przyjmowania produktu leczniczego dolegliwości będą się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

Substancje czynne: Vitex agnus- castus TM 162,0 mg, Caulophyllum thalictroides D4 81,0 mg, Cyclamen purpurascens D4 81,0 mg, Strychnos ignatii D6 81,0 mg, Iris versicolor D2 162,0 mg, Lilium lancifolium D3 81,0 mg.
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Działania niepożądane

Częstotliwość występowania następujących działań niepożądanych nie może być sklasyfikowana na podstawie dostępnych danych:

- ciężkie reakcje alergiczne z obrzękiem twarzy, dusznością i zaburzeniami połykania,
- (alergiczne) reakcje skórne (wysypka i pokrzywka), trądzik,
- bóle głowy, zawroty głowy,
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (takie jak nudności, bóle brzucha),
- zaburzenia miesiączkowania.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W temperaturze nie wyższej niż 25oC.
- W oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek:

- jeśli pacjentka choruje lub chorowała na estrogenozależnego raka,
- jeśli pacjentka stosuje leki mające wpływ na wydzielanie dopaminy (hormon współczulnego układu nerwowego) lub stosuje terapię hormonalną,
- jeśli objawy pogorszą się podczas stosowania leku,
- jeśli pacjentka w przeszłości cierpiała na zaburzenia przysadki mózgowej,
- jeśli objawy mają niejasny, nawrotowy lub przewlekły charakter, gdyż mogą one wynikać ze schorzenia wymagającego dokładniejszej diagnostyki.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.