

Maxibiotic (5 mg + 5000 UI + 400 UI)/ g, maść, 1 g x 10 saszetek



lek OTC



Maxibiotic (5 mg + 5000 IU + 400 IU)/g maść. Skład: 1 g maści zawiera 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 5000 IU polimiksyiny B siarczanu (Polymyxini B sulfas) oraz 400 IU bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum) oraz substancję pomocniczą - wazelinę białą. **Postać farmaceutyczna:** maść. **Wskazania do stosowania:** Maxibiotic stosuje się przy drobnych ranach (otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzeniach, owrzodzeniach skóry. **Podmiot odpowiedzialny:** Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24APTE3, Irlandia. **Max-PL-2311-223**

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Cena: 21,00 zł

Opis słownikowy

Dawka	(5 mg + 5000 UI + 400 UI)/ g,
Opakowanie	10 saszetek
Postać	maść
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Neomycini sulfas, Polymyxini B sulfas, Bacitracinum zincum
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

Maxibiotic, lek w postaci maści dostępny bez recepty, zawierający 3 antybiotyki – neomycynę, polimiksynę B i bacytracynę. Przyspiesza gojenie, nawilża okolice uszkodzonego naskórka i działa przeciwbakteryjnie oraz minimalizuje ryzyko powstania infekcji i wpływa pozytywnie na zapobieganie powstawania blizn. Wygodna forma małych saszetek umożliwi jej łatwe przechowywanie.

Wskazania

Drobne rany (otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzenia, owrzodzenia skóry.

Działanie

- Przyspiesza gojenie, nawilża okolice uszkodzonego naskórka i działa przeciwbakteryjnie.
- Minimalizuje ryzyko powstania infekcji i wpływa pozytywnie na zapobieganie powstawania blizn.

Dawkowanie

- Stosować na skórę.
- Oczyszczyć miejsce zranienia i pokryć niewielką ilością maści. Nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2-5 razy na dobę. Miejsce nałożenia maści można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte.
- Nie należy stosować dłużej niż 7 dni.
- Po zakończeniu leczenia nie należy ponownie stosować produktu leczniczego przed upływem 3 miesięcy.

Skład

1 g maści (pojedyncza saszетка) MaxiBiotic zawiera 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycinisulfas), 5000 IU polimiksyiny B siarczanu (PolymyxiniBsulfas), 400 IU bacytracyny cynkowej (Bacitracinumzincum) oraz substancję pomocniczą – wazelinę białą.

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować u dzieci w wieku od 0 do 12 lat.
- Uczulenie na którykolwiek ze składników leku.
- Zaburzenia słuchu.
- Głębokie rany kłute, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na sączące zmiany chorobowe, ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji czynnych do krwi i wywołania ogólnoustrojowych działań niepożądanych (szkodliwe działanie na słuch, nerki).
- Nie stosować do oczu.

Działania niepożądane

- Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zakażenie opornymi szczepami bakterii lub grzybów.
- Zaburzenia układu immunologicznego: miejscowe objawy nadwrażliwości (świąd, wysypka, zaczerwienienie, obrzęk i inne objawy podrażnienia).
- Zaburzenia ucha i błędnika: ototoksyczność.
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych: nefrotoksyczność.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 30°C.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub pojedynczej saszetce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Po zastosowaniu maści na dużą powierzchnię lub uszkodzoną skórę mogą wystąpić interakcje z innymi stosowanymi jednocześnie lekami.
- Równoczesne zastosowanie leku z doustnie podawaną neomycyną może nasilić ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych.
- Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami mogącymi uszkadzać nerki i narząd słuchu, takimi jak silnie działające leki moczopędne (np. furosemid, kwas etakrynowy). Nasilone zostaje wówczas ryzyko powstania zaburzeń słuchu, aż do głuchoty, która może wystąpić nawet po przerwaniu stosowania leku.

Podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami o szkodliwym działaniu na nerki, słuch lub układ nerwowy, może wystąpić sumowanie działań niepożądanych.

- Długotrwałe stosowanie leku może powodować nadmierne namnażanie niewrażliwych na lek drobnoustrojów, w tym grzybów, podobnie jak w przypadku stosowania innych leków zawierających antybiotyki.
- Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub z upośledzeniem słuchu powinni ostrożnie stosować ten lek, ponieważ istnieje u nich większe prawdopodobieństwo wystąpienia działania szkodliwego na nerki i słuch.
- Nie należy stosować leku w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

