

# Maxicortan, krem, 15 g

Cena: 14,39 zł



## Opis słownikowy

Dawka	10 mg/g
Opakowanie	15 g
Postać	krem
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Hydrocortisonum

## Opis produktu

### Opis

Maxicortan lek w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Substancja czynna octan hydrokortyzonu, która działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo i obkurczająco na naczynia krwionośne.

### Wskazania

Lek stosuje się miejscowo w stanach zapalnych skóry w następujących wskazaniach:

- atopowe zapalenie skóry
- wyprysk kontaktowy alergiczny, pokrzywka
- reakcje występujące po użądleniu lub ukąszeniu przez owady (jak swędzenie i podrażnienie)

### Działanie

- Przeciwzapalne,
- Przeciwświądowe,
- Obkurczające naczynia krwionośne.

### Dawkowanie

- Stosować miejscowo.
- Cienką warstwę kremu nakładać na zmienioną chorobowo skórę 2 lub 3 razy na dobę.
- Na skórę twarzy nie stosować dłużej niż przez 3 dni.
- Nie stosować na zdrową skórę.
- Nie stosować na duże powierzchnie skóry bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ma poprawy po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

### Skład

1 g kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu octanu oraz substancje pomocnicze: makrogolu eter cetostearylowy, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, parafina ciekła, wazelina biała, sorbitanu stearynian, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona

### Przeciwwskazania

- Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat;
- Uczulenie na hydrokortyzonu octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Zakażenie bakteryjne, wirusowe, grzybicze, lub grzybica układowa;
- Trądzik zwykły lub trądzik różowaty;
- Atrofia (zanik) skóry;
- Nowotwór skóry lub stan przednowotworowy skóry;
- Zapalenie skóry okolicy ust;
- Zmiany gruźlicze skóry;
- Otwarte rany i uszkodzoną skórę.

### Działania niepożądane

Długotrwałe stosowanie leku (przez okres dłuższy niż 14 dni), stosowanie na duże powierzchnie skóry lub pod opatrunkiem oraz u dzieci może spowodować wystąpienie następujących objawów niepożądanych: zanikowe zapalenie skóry, rozstępy na skórze; nawrót zakażenia; plamica posteroïdowa (przebarwienia i odbarwienia skóry); powierzchowne rozszerzenie naczyń krwionośnych; trądzik; zapalenie skóry w okolicy ust; zapalenie skóry w okolicy oczu; zapalenie mieszków włosowych, nadmierne owłosienie; opóźnienie gojenia ran i owrzodzeń; nadkażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe; wybroczyny (małe czerwone lub fioletowe plamki na skórze); podrażnienie skóry, takie jak pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość, alergia kontaktowa; jaskra lub zaćma - w przypadku stosowania leku na skórę powiek; zahamowanie czynności osi podwzgórze – przysadka – nadnercza; zespół Cushinga; zahamowanie wzrostu i rozwoju dzieci; hiperglikemia; cukromocz.

### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.