


Melised, syrop, 125 g



Cena: 9,90 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	125 g
Opakowanie	125 g
Postać	płyn
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Wskazania

- Wspomagająco przy nadmiernej pobudliwości nerwowej oraz jako środek ułatwiający zasypianie.
- Dolegliwości trawienne na tle nerwowym.

Działanie

Uspokajające.

Dawkowanie

- Podanie doustne.
- Dorośli i młodzież od 12 lat: po 5 ml syropu 3 do 4 razy dziennie.
- Dzieci od 6 do 12 lat: po 5 ml syropu 2 do 3 razy dziennie.
- Jako środek ułatwiający zasypianie stosować podwójną dawkę przed snem.
- Do opakowania dołączona jest miarka.

Skład

100 g syropu zawiera wyciąg złożony płynny uspokajający (1:1) z ziela melisy / kwiatostanu głogu / kwiatu lipy / kwiatu rumianku (2/2/2/1,5) 7,5 g.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu, zwłaszcza na rumianek lub inne rośliny z rodziny Compositae(Asteraceae).

Działania niepożądane

U osób uczulonych na rumianek mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (dermatoza kontaktowa), szok anafilaktyczny, astma. Możliwe jest także wystąpienie odczynów krzyżowych u osób uczulonych na substancje zawarte w innych roślinach należących do rodziny Asteraceae (dawniej Compositae). Po zastosowaniu przetworów głogu obserwowano: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego,

ból głowy, kołatanie serca, zawroty głowy, wysypkę, ospałość, omdlenia, krwawienia z przewodu pokarmowego, nudności, niewydolność krążenia.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek zawiera do 7% (V/V) etanolu (alkoholu), tzn. do 270 mg na dawkę jednorazową 5 ml, co jest równoważne 6,9 ml piwa i 2,8 ml wina.
- Zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z chorobą wątroby lub z padaczką. Lek może być szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.
- Lek zawiera sacharozę (4,05 g w 5 ml). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.