

Mentho-Paraffinol Hasco 998,75 mg/ g, roztwór doustny, 125 g



Cena: 9,64 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	125 g
Opakowanie	125 g
Postać	roztwór doustny
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paraffinum liquidum

Opis produktu

Wskazania

Zaparcia.

Działanie

Lekko przeczyszczające.

Dawkowanie

- Doustnie 1-3 łyżki stołowe (15-45 ml) na noc, choć nie bezpośrednio przed snem, lub rano na czczo.
- Działanie występuje po kilku godzinach od zastosowania.

Skład

1 g roztworu zawiera:

substancję czynną: parafina ciekła (Paraffinum liquidum) 998,75 mg,
substancję pomocniczą: olejek mięty pieprzowej.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.
- Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

- Po otwarciu opakowania lek może być stosowany przez 3 miesiące.
- W zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Osoby z zaburzeniami połykania lub niektórymi chorobami neurologicznymi powinny uważać, by nie doszło do zachłyśnięcia i przedostania się parafiny do dróg oddechowych.
- Lek stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia objawów lub niewystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1 do 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.
- Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia.
- U dzieci i osób w podeszłym wieku należy stosować minimalną skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres.
- W okresie ciąży i karmienia piersią lek można stosować w przypadkach uzasadnionych pod kontrolą lekarza.
- Lek może zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tj. A, D, E i K oraz równocześnie stosowanych leków doustnych.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.