

Minovivax 2% 20 mg/ml, roztwór na skórę, 100 ml



Cena: 30,79 zł

Opis słownikowy

Dawka	20 mg/ml
Opakowanie	100ml
Postać	roztwór na skórę
Producent	AXXON SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Minoxidilum

Opis produktu

Opis

Minovivax 2%, lek w postaci roztworu na skórę. Substancja czynna leku jest Minoksydyl. Minovivax 2% jest lekiem przeznaczonym do stosowania wyłącznie na skórę głowy. Wskazany jest w leczeniu łysienia androgenowego (wypadania włosów) u osób dorosłych.

Wskazania

W leczeniu łysienia androgenowego (wypadania włosów) u osób dorosłych.

Działanie

Minoksydyl rozszerza obwodowe naczynia krwionośne, jednak dokładny mechanizm jego działania pobudzającego wzrost włosów jest nieznany.

Dawkowanie

- Dawkę 1 ml leku należy nakładać na skórę głowy dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Nie przekraczać dawki dobowej 2 ml bez względu na wielkość powierzchni skóry objętej zmianami.
- Przed miejscowym zastosowaniem należy całkowicie osuszyć włosy i skórę głowy.
- Skierować pompkę rozpylającą w kierunku powierzchni skóry objętej zmianami. Nacisnąć pompkę 6 razy w celu podania dawki 1 ml. Zaaplikować roztwór na środkową część powierzchni skóry objętej zmianami i rozprowadzić opuszkami palców, upewniając się, że lek został nałożony równomiernie. Po aplikacji roztworu zawsze należy dokładnie umyć ręce.

Skład

Substancja czynna: minoksydyl (Minoxidilum).

1 ml roztworu na skórę zawiera 20 mg minoksydylu.

Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol bezwodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nie należy aplikować na części ciała inne niż skóra głowy,
- Uczulenie na minoksydyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Nie jest wskazany do stosowania w leczeniu łysienia plackowatego (nagła lub niewyjaśniona utrata włosów),
- W przypadku wypadania włosów spowodowanego stosowaniem niewłaściwej diety,
- Podczas leczenia cytostatycznego (przeciwnowotworowego),
- W przypadku wypadania włosów spowodowanego zakończeniem stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
- Uszkodzona skóra głowy (np. w wyniku oparzeń, owrzodzenia lub w przypadku występowania tkanki bliznowatej),
- Jeżeli wypadanie włosów zostało spowodowane przez niewłaściwą pielęgnację włosów (np. zbyt mocne wiązanie włosów),
- Ciąża oraz karmienie piersią,
- Wypadanie włosów po porodzie.

Działania niepożądane

- Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy.
- Często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): duszność, świąd, nadmierne owłosienie (w przypadku kobiet także na twarzy), zapalenie skóry, wysypka

trądzikopodobna, wysypka, obrzęk obwodowy, zwiększenie masy ciała.

- Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów): zawroty głowy, nudności.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): obrzęk naczynioruchowy (w tym: obrzęk warg i języka, obrzęk jamy ustnej i gardła, obrzęk błony śluzowej jamy ustnej i gardła), nadwrażliwość (w tym: obrzęk twarzy, rumień wielopostaciowy, świąd, uczucie ucisku w gardle), alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, podrażnienie oczu, tachykardia (przyspieszona czynność serca), kołatanie serca, niedociśnienie, wymioty, dolegliwości w miejscu podania, obejmujące również uszy i twarz (w tym: podrażnienie skóry i zaczerwienienie, świąd, ból, obrzęk, suchość skóry, rumień), łuszczenie skóry, zapalenie skóry,

pęcherze, krwawienie i owrzodzenia, niekiedy o ciężkim przebiegu, przejściowa utrata włosów, zmiana koloru włosów i zmiana struktury włosów, ból w klatce piersiowej.

- Niektórzy pacjenci na początku leczenia minoksydylem zauważyli wzmożone wypadanie włosów. Ten chwilowo nasilony proces utraty włosów występuje najczęściej w ciągu 2-6 tygodni po rozpoczęciu stosowania minoksydylu i ustępuje samoistnie w ciągu kilku tygodni.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.