

Mobilat żel, 100 g



Cena: 30,79 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 g
Dawka	(200mg+1g+2g)/100g
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Heparinoidum, Suprarenali extractum, Acidum salicylicum

Opis produktu

Opis

Mobilat, lek w postaci żelu. Zawiera ekstrakt z kory nadnerczy o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwwysiękowych. Działanie to wspomaga kwas salicylowy, który dodatkowo wywiera działanie przeciwbólowe i ułatwia penetrację biologicznie czynnych składników leku Mobilat do tkanek. Mukopolisacharydowy polisaccharan działa przeciwzapalnie i zmniejsza miejscowo krzepliwość krwi, zwiększa przepływ tkankowy i przyspiesza regenerację tkanek.

Wskazania

Leczenie:

- Pourazowych stanów zapalnych stawów i krwiaków,
- Bólów występujących podczas ruchu i w stanach przeciążeniowych mięśni i ścięgien.

Działanie

- Przeciwzapalne.
- Przeciwwysiękowe.
- Przeciwbólowe.

Dawkowanie

- Jeśli lekarz nie zaleci inaczej należy 1 raz lub 3 razy na dobę na zmienione chorobowo miejsca nakładać pasek żelu o długości od 5 do 15 cm i delikatnie wmasować w skórę. Jeżeli pacjent stosuje opatrunek okluzyjny dawkę można odpowiednio zwiększyć.
- Długotrwałe stosowanie leku Mobilat na dużych obszarach powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.
- Stosować miejscowo na skórę i dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Okres stosowania leku Mobilat określa lekarz i zależy on od rodzaju i przebiegu choroby.

Skład

Substancje czynne: mukopolisacharydowy polisiarczan, ekstrakt z kory nadnerczy i kwas salicylowy.

Pozostałe składniki: disodu edetynian, olejek rozmarynowy, etanoloamina, karbomer, glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników Mobilat żel.
- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat bez przepisu lekarza.

Działania niepożądane

- Rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 osoby na 1000): miejscowe podrażnienia skóry
- Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 osoby na 10 000): uczulenia kontaktowe.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.