

# Mucopect Control 375 mg, 30 kapsułek twardych



Cena: 24,90 zł

## Opis słownikowy

Dawka	375 mg
Opakowanie	30 kapsułek twardych
Postać	kapsułki twarde
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Carbocisteinum

## Opis produktu

### Opis

Mucopect Control, lek przeznaczony dla osób dorosłych, o działaniu mukolitycznym, wskazany w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny. Karbocysteiny ułatwia odkrztuszanie oraz upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych. Nie zawiera substancji słodzących.

### Wskazania

W objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

### Działanie

- Zmniejszenie lepkości śluzu (flegmy).
- Wydzielina śluzowa jest łatwiejsza do odkrztuszenia.

### Dawkowanie

- Zwykle dawka początkowa wynosi 2 kapsułki przyjmowane 3 razy na dobę.
- Jeśli nasilenie objawów zmniejszy się, dawkę należy zmniejszyć do jednej kapsułki przyjmowanej cztery razy na dobę.
- Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku dłużej niż 4 do 5 dni.
- W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.
- Nie należy stosować leku przed snem. Ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem.

### Skład

Każda kapsułka, twarda zawiera 375 mg karbocysteiny.

### Przeciwwskazania

- Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży.
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Czynna choroba wrzodowa.

### Działania niepożądane

- Należy przerwać przyjmowanie leku Mucopect Control i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do izby przyjęć w szpitalu, jeśli: wystąpiła reakcja alergiczna. Może się objawiać: wysypką, trudnościami z przełykaniem lub oddychaniem, obrzękiem ust, twarzy, gardła lub języka. Na skórze pojawiły się krwawiące rany lub pęcherze, w tym w okolicach warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych. Mogą także występować objawy grypopodobne i gorączka. Może być to tak zwany „zespół Stevensa-Johnsona”. W wymiotach jest widoczna krew lub pacjent wydalą czarne, smoliste stolce.
- Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdy którekolwiek z następujących działań niepożądanych się nasila lub trwa dłużej niż kilka dni: wymioty.

### Przechowywanie

W sposób niedostępny dla dzieci.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.