

Mucopect Kids 50mg/ml, syrop, 200 ml



Cena: 23,95 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	200 ml
Dawka	50 mg/ml
Opakowanie	200 ml
Postać	syrop
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Carbocisteinum
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Opis

Mucopect Kids, lek w postaci syropu. Zawiera substancję leczniczą o nazwie karbocysteina. Należy ona do grupy substancji zwanych „mukolitykami”, stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wydzielaniem śluzu w oskrzelach.

Wskazania

W objawowym leczeniu chorób dróg oddechowych, przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

Działanie

Karbocysteina powoduje zmniejszenie lepkości śluzu (flegmy), dzięki czemu łatwiej usuwany jest z dróg oddechowych podczas kaszlu.

Dawkowanie

- Za pomocą miarki (łyżka miarowa o objętości 5 ml) należy odmierzyć ilość leku odpowiednią dla pacjenta (dziecka lub dorosłego) zgodnie z zalecanym dawkowaniem. Łyżka miarowa stosowana do odmierzenia dawki doustnej ma objętość 5 ml i podziałkę wskazującą 1,25 ml, 2,5 ml, 3,75 ml i 5,0 ml.
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: dawka dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat to: 15 ml syropu trzy razy na dobę. Po złagodzeniu objawów, dawkę należy zmniejszyć do 10 ml syropu trzy razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 mL syropu trzy razy na dobę.
- Po przyjęciu dawki syropu należy dokładnie zamknąć butelkę.
- Nie należy stosować leku przed snem. Ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem.
- Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni.
- Zalecane jest przyjmowanie zwiększonej ilości płynów podczas stosowania tego leku.

Skład

Substancją czynną leku jest karbocysteina.

1 ml syropu zawiera 50 mg karbocysteiny.

Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), karmel (E 150d), sacharoza, aromat agrestowy „Aroma grosella 63 2334” (glikol propylenowy, mrówczan etylu, octan izopentylu, 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one, 3-metylobutan-1-ol, gruszlina karbolistny (Barosma betulina) ekstrakt, kwas octowy, 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one), sodu wodorotlenek i woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego;
- Jeśli pacjent ma wrzody żołądka i (lub) dwunastnicy.

Działania niepożądane

- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, zespołu Stevensa-Johnsona (pojawienie się na skórze krwawiących ran lub pęcherzy, w tym w okolicach warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych oraz wystąpienie objawów grypopodobnych i gorączki) oraz wystąpienia krwi w wymiotach lub stolcu, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się na izbę przyjęć do szpitala.
- Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób): nudności, wymioty i biegunka.
- Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): krwawienia z przewodu pokarmowego, zaburzenia żołądkowe, ból brzucha, reakcje alergiczne (wysypka skórna, świąd, pokrzywka).
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): bóle głowy, pojedyncze przypadki pęcherzowego zapalenia skóry takie jak zespół Stevensa-Johnsona, u pacjentów nadwrażliwych może wystąpić zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i nosa.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mucopect Kids należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

- u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa.
- pacjent ma ostrą niewydolność oddechową.
- pacjent jest osłabiony. Osłabienie odruchu kaszlowego wiąże się z ryzykiem niedrożności dróg oddechowych wskutek wzrostu ilości wydzieliny.

Leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, dlatego pacjenci, u których występowała w przeszłości choroba wrzodowa powinni stosować je z dużą ostrożnością.

W przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc oraz u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do odrzucania konieczna jest wizyta u lekarza, który może zalecić inne leki.

Leczenie pacjentów z astmą oskrzelową powinno przebiegać pod dokładną kontrolą lekarską ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu, należy natychmiast przerwać podawanie leku.

Nie należy zażywać leku przed snem.

- Lek nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.
- Nie należy stosować karbocysteiny jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi i lekami zmniejszającymi wydzielinę.
- Nie zaleca się stosowania leku w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią. Nie wiadomo, czy karbocysteina przenika do mleka matki. Brak danych dotyczących wpływu karbocysteiny na płodność.
- Karbocysteina nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Lek zawiera sacharozę. Może wpływać szkodliwie na zęby. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 1 ml leku zawiera 577,5 mg sacharozy. Dawka przeznaczona dla dorosłych, tj. 15 ml syropu zawiera 8,7 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
- Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218): lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.