

Mucovagin, globulki dopochwowe z drobnocząsteczkowym kwasem hialuronowym, 10 globulek



Cena: 39,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 globulek
Postać	globulki
Producent	VERCO
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Mucovagin globulki to innowacyjny preparat, który posiada w swoim składzie formułę drobnocząsteczkowego kwasu hialuronowego BASHYAL, który jest także dedykowany kobietom po zabiegach ginekologicznych, w tym ginekologii estetycznej. Szybko nawilża i regeneruje. Kwas hialuronowy, który jest naturalnym budulcem organizmu ludzkiego wiążąc się z wilgotną wydzieliną błony śluzowej pochwy, tworzy na jej powierzchni żelową powłokę, która stanowi barierę ochronną zabezpieczającą błonę śluzową i stwarzającą odpowiednie warunki do aktywacji naturalnych mechanizmów regeneracyjnych i obronnych. W ten sposób zapobiega rozwojowi flory patogennej, przywraca naturalną wilgotność, ułatwia i przyspiesza procesy gojenia.

Zastosowanie

- Odczucie suchości i dyskomfortu okolic intymnych (pieczenie, napięcie), także podczas stosunku
- W okresie menopauzy aby odbudować nabłonek pochwy.
- W celu poprawy jakości życia intymnego.
- Przy antykoncepcji hormonalnej.
- Po zabiegach i operacjach ginekologicznych (w tym ginekologii estetycznej).
- Gdy nie chcesz lub nie możesz stosować hormonalnej terapii zastępczej.
- Po porodzie karmieniu piersią.

Sposób użycia

- Umyć ręce przed i po użyciu.
- Standardowo: 1 globulka dziennie dopochwowo, wieczorem przed snem lub według wskazań lekarza.
- Terapia wspomagająca: 1 globulka dopochwowa na noc co 3 dni lub według wskazań lekarza.
- Do stosowania wyłącznie wewnętrznego.

Skład

Kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego), tłuszcz stały (glicerydy półsyntetyczne).

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C, w zacienionym i miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Od pierwszego otwarcia zużyć w ciągu miesiąca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

Dodatkowe informacje

- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Interakcje z innymi lekami lub wyrobami medycznymi dopochwowymi nie są znane.
- Przed zastosowaniem należy zasięgnąć konsultacji lekarza lub farmaceuty.
- Stosować tylko zgodnie z instrukcją używania zamieszczoną na opakowaniu lub załączonej ulotce.