

## Multi Sanostol, syrop, 300 g



Cena: 20,61 zł

### Opis słownikowy

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Cena jednostkowa  | 300 g                    |
| Opakowanie        | 300 g                    |
| Postać            | syrop                    |
| Producent         | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. |
| Rejestracja       | Lek                      |
| Substancja czynna | Produkt złożony          |
| Wiek              | od 1 roku życia          |

### Opis produktu

#### Opis

Multi-Sanostol jest lekiem wielowitaminowym w postaci syropu. W swoim składzie zawiera zarówno witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (witaminy A, D3, E), jak i w wodzie (witaminy B1, B2, B6, C, PP, dekspantenol) oraz dodatkowo wapń. Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Syrop dla dzieci powyżej 1. roku życia, oraz dla młodzieży i dorosłych.

#### Wskazania

- Utrata apetytu.
- Okres wzrostu i rozwoju.
- Skłonność do częstych infekcji.
- Stany wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczenie.
- Obniżona zdolność koncentracji.
- Okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii.
- Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy.
- W celu poprawy ogólnej kondycji organizmu.

#### Działanie

Wsparcie prawidłowego funkcjonowania organizmu.

#### Dawkowanie

- Doustne.
- Przed użyciem wstrząsnąć butelkę.
- Dzieci w wieku 1 do 6 lat: po 5 ml syropu 2 razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorośli: po 10 ml syropu 2 razy na dobę.

### Skład

Substancja czynna: witamina D3, witamina A, witamina B1, witamina B2, witamina B6, witamina C, witamina E, witamina PP, dekspantenol, wapnia glukonian, wapnia fosforomleczan.

10 ml produktu zawiera: witaminę A – retynolu palmitynian 2400 j.m.; witaminę D3 – cholekalcyferol 200 j.m.; witaminę B1 – tiaminy chlorowodorek 2 mg; witaminę B2 – ryboflawiny sodu fosforan 2 mg; witaminę B6 – pirydoksyny chlorowodorek 1 mg; witaminę C – kwas askorbowy 100 mg; witaminę E - all-rac- $\alpha$ -tokoferylu octan 2 mg; witaminę PP – nikotynamid 10 mg; dekspantenol 4 mg; wapnia glukonian 50 mg; wapnia fosforomleczan 50 mg.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: syrop glukozowy, sodu benzoesan, kwas sorbowy, sacharoza.

### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Zwiększone stężenie witaminy A lub D (hiperwitaminoza A lub D).
- Zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcynuria).
- Osoby z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

### Działania niepożądane

W pojedynczych przypadkach odnotowano reakcje alergiczne.

### Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Po otwarciu butelki, leku nie przechowywać dłużej niż 3 miesiące.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.