Naproxen Emo 100 mg/ g, żel, 100 g

Cena: 21,50 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 g
Dawka	100 mg/ g
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Producent	VALEANT SP. Z O.O. SP.J.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Naproxenum

Opis produktu

Opis
NaProxen Emo, lek w postaci żelu. Substancja czynna naproksen w ilości 100 mg/g, należąca do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek stosuje się miejscowo, na skórę przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Zmniejsza ból i obrzęk oraz powrót sprawności ruchowej. Lek wywołuje na skórze przyjemne uczucie chłodu.

Wskazania

- Bóle mięśniowo-stawowe;
- Choroba zwyrodnieniowa stawów.

Działanie

- Przeciwbólowe.
- Przeciwzapalne.

Dawkowanie

- Nałożyć lek na skórę w ilości zależnej od rozmiarów bolącego miejsca (najczęściej pasek żelu o długości około 4 cm),
- Rozprowadzić w miejscu bólu i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Lek należy stosować od 4 do 5 razy na dobę, najczęściej w odstępach kilkugodzinnych.
- Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.
- Nie należy stosować leku dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni).
- Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią lub nasilą się po upływie 1 tygodnia stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
- W razie wystąpienia zaczerwienienia i podrażnienia skóry należy przerwać stosowanie leku do ustąpienia objawów, w razie nie ustąpienia objawów należy zgłosić się do lekarza.

Skład
Substancją czynną leku jest naproksen.
Pozostałe składniki to: chloralu wodzian, lewomentol, etanol 96%, etylu parahydroksybenzoesan, sodu wodorotlenek, karbomer, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na naproksen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz kwas acetylosalicylowy;
- Stan zapalny skóry, uszkodzenie skóry lub otwarte rany;
- Dzieci poniżej 3 lat.

Działania niepożądane
Skóra i tkanka podskórna
Rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000) może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, świąd), które ustępuje po odstawieniu leku.

W przypadku, gdy lek jest stosowany na duże powierzchnie skóry, przez dłuższy okres czasu, nie można wykluczyć wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych np. nudności, biegunka, senność, bóle głowy, reakcje nadwrażliwości (uczulenia). W takich przypadkach należy powiadomić lekarza. W przypadku wystąpienia duszności lub zmian skórnych należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.