

# Narivent, przeciwobrzękowy aerozol do nosa, 20 ml



Cena: 33,95 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	20 ml
Postać	aerozol do nosa
Producent	DMG POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

### Opis

Wyrób medyczny Narivent, przeciwobrzękowy aerozol do nosa o działaniu osmotycznym, wywierający efekt przeciwobrzękowy i przeciwzapalny. Wskazany jest u pacjentów z przerostem małżowin nosowych w celu zmniejszenia niedrożności nosa, w swoistym (alergicznym) lub nieswoistym naczynioruchowym nieżycie nosa, w leczeniu obrzęku towarzyszącego ostrym i przewlekłym stanom zapalnym zatok przynosowych i migdałka gardłowego, w leczeniu i profilaktyce pooperacyjnych nawrotów polipów nosa, w leczeniu przed i pooperacyjnym patologii nosa i zatok przynosowych.

### Zastosowanie

- Przerost małżowin nosowych w celu zmniejszenia niedrożności nosa,
- Swoisty (alergiczny) lub nieswoisty naczynioruchowy nieżyt nosa,
- Leczenie obrzęku towarzyszącego ostrym i przewlekłym stanom zapalnym zatok przynosowych i migdałka gardłowego,
- Leczenie i profilaktyka pooperacyjnych nawrotów polipów nosa,
- Leczenie przed i pooperacyjnym patologii nosa i zatok przynosowych.

### Sposób użycia

- Pochylić głowę lekko do przodu i rozpylić aerozol w otworze nosowym, nie wykonując wdechu w czasie aplikacji.
- Dorośli i dzieci: zaleca się dwa rozpylenia do każdego otworu nosowego 2 razy dziennie (chyba, że lekarz zaleci inaczej).

### Skład

Mannitol, glicyryzyny dwupotasowy, glicerol, kopolimer PEG/PPG, sól dwusodowa EDTA, N-hydroksymetyloglicynian sodu, polisorbitat 20, sorbinian potasu, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona, aromaty naturalne.

### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 30°C.

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik.
- Podczas pierwszych zastosowań może wystąpić przejściowy wodnisty wyciek z nos, połączony z uczuciem swędzenia o niewielkim nasileniu i łagodnym kichaniem. Wynika to ze specyficznego mechanizmu działania produktu.
- W przypadku leczenia pooperacyjnego należy upewnić się czy nie występuje nadwrażliwość lub nietolerancja preparatu.

#### Dodatkowe informacje

- Unikać kontaktu z oczami.
- Preparat ze względów higienicznych powinien być używany przez jedną osobę.