

# Nasic Kids (0,05 mg + 5 mg)/ dawkę, aerozol do nosa, 10 ml



Cena: 19,79 zł

## Opis słownikowy

Dawka	(0,05mg+5mg)/dawka
Opakowanie	10 ml
Postać	aerozol do nosa
Producent	CASELLA-MED GMBH KOLN
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum, Dexpanthenolum

## Opis produktu

### Opis

Nasic kids, lek w postaci aerozolu do nosa. Zawiera dwie substancje czynne: ksylometazoliny chlorowoderek i deksopantenol. Lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

### Wskazania

Objawowe leczenie niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa dla pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa. Nasic Kids wskazany jest do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

### Działanie

- Ksylometazolina obkurcza naczynia krwionośne, co prowadzi do zmniejszenia obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa ułatwia oddychanie przez nos pacjentom, u których występują objawy niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia i po przebytej operacji nosa.
- Dekspantenol jest pochodną kwasu pantotenowego, witaminy przyspieszającej gojenie się ran i biorącej udział w procesie regeneracji błon śluzowych.

### Dawkowanie

- Jeśli lekarz nie zaleci inaczej dzieci w wieku 2 do 6 lat: jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego raz lub dwa razy na dobę (co 8-10 godzin).
- Nie podawać więcej niż trzy dawki do każdego otworu nosowego na dobę.
- Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości i reakcji pacjenta na lek.
- Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
- Nie należy stosować leku dłużej niż 7 dni, chyba że lekarz wyraźnie zalecił kontynuowanie stosowania.
- Ponowne stosowanie powinno nastąpić dopiero po kilkudniowej przerwie.

### Skład

Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu, co odpowiada 0,10 g) zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodoru (Xylometazolini hydrochloridum) i 5,0 mg deksopantenolu (Dexpanthenolum).

### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na chlorowoderek ksylometazoliny, deksopantenol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.
- Suchość zapalenie błony śluzowej nosa, po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej.
- Nasic Kids zawiera chlorek benzalkoniowy dlatego nie powinien być stosowany przez osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na tę substancję konserwującą.
- Dzieci w wieku poniżej 2 lat.

### Działania niepożądane

- Zaburzenia układu nerwowego: bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 osób): pobudzenie, bezsenność, zmęczenie (np. senność, sedacja), ból głowy, halucynacje (szczególnie u dzieci).
- Zaburzenia serca: rzadko (u mniej niż u 1 na 1000 osób): kołatanie serca (palpitacje), przyspieszenie pracy serca (tachykardia). Bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 osób): zaburzenia rytmu serca (arytmie serca).
- Zaburzenia naczyniowe: rzadko (u mniej niż u 1 na 1000 osób): wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze).
- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 osób): po ustaniu działania leku zwiększony obrzęk błony śluzowej nosa, krwawienia z nosa. Częstość nieznana: uczucie pieczenia i suchości błony śluzowej nosa, kichanie.
- Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 osób): skurcze (szczególnie u dzieci).
- Zaburzenia układu immunologicznego: niezbyt często (u mniej niż u 1 na 100 osób): reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk skóry i błon śluzowych, wysypka skórna, świąd).

### Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.