

# Nasivin Baby 0,1 mg/ ml, krople do nosa dla niemowląt od 3 miesiąca, 5 ml



Cena: 27,50 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,1 mg/ml
Opakowanie	5 ml
Postać	krople do nosa
Producent	P&G Health Germany GmbH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Oksymetazolini hydrochloridum
Wiek	od 3 miesiąca

## Opis produktu

### Wskazania

W obrzęku błon śluzowych występującym w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.

### Działanie

Zmniejsza obrzęk zmienionej zapalnie błony śluzowej i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos.

### Dawkowanie

- Niemowlęta powyżej 3.miesiąca życia do ukończenia 1.roku życia: wkraplać po 1 do 2 kropli Nasivin Baby do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.
- Leku nie należy stosować dłużej niż 5 do 7 dni.

### Skład

Substancją czynną leku jest oksymetazolini chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 0,1 mg oksymetazolini chlorowodorku. 1 kropla roztworu zawiera 2,8 mikrogramów oksymetazolini chlorowodorku.

Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowyjednowodny, sodu cytrynian, glicerol85%, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

- Suche zapalenie błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów).
- Uczulenie (nadwrażliwość) na oksymetazolini chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nasivin Baby.

### Działania niepożądane

- Działania niepożądane występujące często (u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów stosujących lek): pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa, kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych.
- Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1000 pacjentów stosujących lek): objawy ogólnoustrojowe, takie jak kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca i wzrost ciśnienia tętniczego, występujące po miejscowym (donosowym) stosowaniu leku.
- Działania niepożądane występujące rzadko (u mniej niż 1 na 1000, ale u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek): ból głowy, bezsenność lub zmęczenie.

W rzadkich przypadkach po ustąpieniu działania leku może dojść do nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (tzw. reaktywnego przekrwienia). Przedłużone lub częste stosowanie, jak również stosowanie większych niż zalecane dawek leku może prowadzić do reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Takie działanie może wystąpić już po 5-7 dniach leczenia i, w przypadku dalszego stosowania leku, doprowadzić do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa.

#### Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Okres ważności leku Nasivin Baby po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 12 miesięcy. Nie należy stosować leku Nasivin Baby po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.