

# Nasivin Kids 0,025 % 0,25 mg/ ml, aerozol do nosa, dla dzieci od 1 do 6 lat, 10 ml



Cena: 28,95 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,25 mg/ml
Opakowanie	10 ml
Postać	aerozol do nosa
Producent	P&G Health Germany GmbH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum
Wiek	od 1 roku życia

## Opis produktu

### Wskazania

- W obrzęku błon śluzowych występującym w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- Naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- Alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- Zapaleniu zatok przynosowych,
- Zapaleniu trąbki słuchowej,
- Zapaleniu ucha środkowego.

### Działanie

Zmniejsza obrzęk zmienionej zapalnie błony śluzowej i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa powoduje również otwarcie i rozszerzenie przewodów odprowadzających zatok przynosowych i odblokowuje trąbki słuchowe. Ułatwia to usuwanie wydzieliny i wyleczenie zakażenia bakteryjnego.

### Dawkowanie

- Dzieci powyżej 1 roku życia do 6 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.
- Leku nie należy stosować dłużej niż 5 do 7 dni.

### Skład

Substancją czynną leku jest oksymetazolini chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazolini chlorowodoru. 1 dawka aerozolu o objętości 45 mikrolitra zawiera 11,25 mikrograma oksymetazolini chlorowodoru. Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glicerol85%, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

- Suche zapalenie błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów).
- Uczulenie (nadwrażliwość) na oksymetazolinę chlorowodork lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nasivin Kids.
- Nie należy stosować u niemowląt w pierwszym roku życia.

### Działania niepożądane

- Często (u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów stosujących lek): pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa, kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych.
- Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1000 pacjentów stosujących lek): objawy ogólnoustrojowe, takie jak kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca i wzrost ciśnienia tętniczego, występujące po miejscowym (donosowym) stosowaniu leku.
- Rzadko (u mniej niż 1 na 1000, ale u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek): ból głowy, bezsenność lub zmęczenie.

W rzadkich przypadkach po ustąpieniu działania leku może dojść do nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (tzw. reaktywnego przekrwienia). Przedłużone lub częste stosowanie, jak również stosowanie większych niż zalecane dawek leku, Nasivin Kids może prowadzić do reaktywnego przekrwienia, z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Takie działanie może wystąpić już po 5-7 dniach leczenia i, w przypadku dalszego stosowania leku, doprowadzić do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa.

### Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Okres ważności leku po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 12 miesięcy. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.