

# Nasometin Control 0,05 mg, aerozol do nosa, 60 dawek



Cena: 24,63 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,05 mg
Opakowanie	10 g
Postać	aerozol do nosa, zawiesina
Producent	SANDOZ GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Mometasonum

## Opis produktu

### Wskazania

Leczenie objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych w wieku od 18 lat.

### Działanie

Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

### Dawkowanie

- Podanie do nosa.
- Dorośli w wieku od 18 lat: zwykle 2 rozpylenia (po 50 µg) do każdego otworu nosowego raz na dobę (łącznie 200 µg), a po opanowaniu objawów dawkę podtrzymującą można zmniejszyć do 1 rozpylenia do każdego otworu nosowego (łącznie 100 µg).
- Początek znaczącego działania może nastąpić w ciągu 12 h od podania pierwszej dawki, ale pełnego działania leku można nie uzyskać w ciągu pierwszych 48 h.
- Należy regularnie stosować lek.
- Umiarkowane lub ciężkie objawy sezonowego alergicznego nieżytu nosa w wywiadzie mogą wymagać rozpoczęcia leczenia na kilka dni przed początkiem okresu pylenia. Jeśli po max. 14 dniach stosowania nie nastąpi poprawa lub jest ona niewystarczająca, należy zwrócić się do lekarza.
- Leku nie stosować dłużej niż 1 miesiąc bez konsultacji z lekarzem.

### Skład

Każde rozpylenie zawiera odmierzoną dawkę 50 mikrogramów (µg) mometazonufuroinianu (w postaci mometazonufuroinianu jednowodnego).

Lek zawiera 0,02 mg/dawkę chlorku benzalkoniowego.

### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Niedawno przebyta operacja nosa lub uraz nosa (do czasu wyleczenia, gdyż kortykosteroidy hamują gojenie się ran).
- Nielezione miejscowe zakażenie błony śluzowej nosa (tj. opryszczka).
- Nie stosować u dzieci <18 lat.

#### Działania niepożądane

- Często: zapalenie gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, ból głowy, krwawienie z nosa, pieczenie/podrażnienie/owrzodzenie nosa.
- Częstość nieznana: duszność, nadwrażliwość, w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, jaskra, zaćma, niewyraźne widzenie, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, perforacja przegrody nosa, zaburzenia węchu i smaku.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.