

Nebu-Dose Isotonic, 0,9% roztwór do nebulizacji, 5 ml x 100 ampułek



Cena: 39,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	5 ml x 100 ampułek
Postać	płyn do inhalacji
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Nebu-Dose Isotonic, 0,9% roztwór do nebulizacji, nie zawiera konserwantów. Działanie preparatu polega na wykorzystaniu różnych mechanizmów ułatwiających usunięcie wydzieliny z dróg oddechowych, poprawiając w ten sposób komfort oddychania

Zastosowanie

- Do terapii inhalacyjnej, szczególnie zalecany pacjentom cierpiącym na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP).
- Płukanie i przemywanie oczu,
- Higiena nosa.

Sposób użycia

- Terapia inhalacyjna: może być stosowany z dowolnym rodzajem nebulizatora. Roztwór należy stosować zgodnie z instrukcją użytkowania dołączoną do produktu do inhalacji. Używać 4 ml lub 5 ml roztworu w terapii wziewnej zgodnie z zaleceniem lekarza.
- Higiena oczu: do zakraplania, przemywania lub płukania. Roztwór może być stosowany na powierzchnię oka po nałożeniu soczewek kontaktowych. Delikatnie nacisnąć ampułkę, aby zakropić kilka kropli roztworu na powierzchnię oka. Powtarzać tyle razy, ile potrzeba.
- Higiena nosa: do płukania i oczyszczania suchego lub zatkanego nosa: odchylić głowę do tyłu. Wprowadzić ostrożnie końcówkę ampułki do otworu nosowego i delikatnie nacisnąć, zakraplając kilka kropli. Tak samo postąpić w drugim otworze nosowym. Wyprostować głowę w celu umożliwienia odpływu śluzu i wytrzeć nadmiar płynu. Używać tyle razy, ile potrzeba. Nie wydmuchiwać nosa przez 10 minut po zastosowaniu preparatu. Niemowlętom aplikować preparat przy użyciu jak najmniejszej siły celem uniknięcia jakichkolwiek powikłań w uchu środkowym.

Skład

Sterylny roztwór chlorku sodu 0,9%.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci,

- W temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Preparat może być stosowany jako nośnik dla innych leków do inhalacji.
- Tej samej ampułki nie należy używać jednocześnie do oczu i nozdry.
- Należy odczekać 15 minut przed zastosowaniem jakiegokolwiek innego preparatu do oczu.
- Nie wydmuchiwać nosa przez 10 minut po zastosowaniu preparatu.
- Nie należy stosować preparatu w połączeniu z innymi lekami bez wcześniejszej konsultacji.