

# Nefrol, płyn doustny 4,5 g/5 ml, 100 ml



Cena: 5,90 zł

## Opis słownikowy

Dawka	4,5 g/5 ml
Opakowanie	100 ml
Postać	płyn doustny
Producent	KRAKOWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.
Rejestracja	Lek
Wiek	od 12 roku życia

## Opis produktu

### Wskazania

Środek pomocniczy w chorobach dróg moczowych, w kamicy nerkowej w drobnych złożach (tzw. piasku nerkowym). Tradycyjnie stosowany jako środek moczopędny.

### Działanie

Moczopędne.

### Dawkowanie

- Dorośli: doustnie 3 x dziennie po 1 łyżeczce preparatu (5 ml) w 50 ml wody. Podczas stosowania produktu zaleca się wypijanie dużej ilości płynów.
- Młodzież i dzieci powyżej 7 roku życia: Dopuszcza się stosowanie po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Dawkowanie według zaleceń lekarza.
- Nie zaleca się stosowania przez okres dłuższy niż 1-2 tygodnie bez konsultacji lekarskiej.

### Skład

Skład na 100 g produktu:

Tinctura compositum (1:7) ex:

Solidaginis herba (ziele nawłoci) – 6,9 g

Taraxaci radice cum herba (korzeń mniszka z ziołem) – 3,7 g

Ammi visnagae fruktu (owoc aminka) – 2,47 g

Phaseoli pericarpio (owocnia fasoli) – 0,71 g

Ekstrahent: etanol 70%

Produkt zawiera 61- 69 % (v/v) etanolu.

### Przeciwwskazania

- Dzieci poniżej 7 roku życia.
- Nadwrażliwość na mniszka lekarskiego lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae - dawniej Compositae).
- Nadwrażliwość na którykolwiek inny składnik produktu.
- Kamica żółciowa i inne choroby dróg żółciowych, niedrożność dróg moczowych.

#### Działania niepożądane

Możliwe wystąpienie reakcji alergicznych ze względu na obecność mniszka.

#### Przechowywanie

- W zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jednorazowa dawka produktu (5 ml płynu) zawiera ok. 2,7 g alkoholu. Ze względu na wysoką zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania produktu u osób cierpiących na choroby wątroby, padaczkę i alkoholizm.
- Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania produktu u młodzieży i dzieci poniżej 12 lat. Nie podawać dzieciom do 7 roku życia, u pozostałych dzieci produkt może być stosowany tylko po konsultacji lekarskiej w uzasadnionych przypadkach.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią lub towarzyszyć im będą: gorączka, ból i trudności w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować w obrzękach spowodowanych niewydolnością serca lub nerek.
- Nie zaleca się stosowania produktu u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.