

Neo-Angin, 24 tabletki do ssania



Cena: 17,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg
Opakowanie	24 tabletki do ssania
Postać	tabletki do ssania
Producent	DIVAPHARMA GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Alcohol dichlorobenzylum, Amylmetacresolum, Levomentholum

Opis produktu

Wskazania

Wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

Działanie

- Przeciwbakteryjne.
- Przeciwgrzybicze
- Lewomentol, który wywołuje na błonach śluzowych uczucie chłodu i ma słabe działanie znieczulające.

Dawkowanie

- Stosować doustnie.
- Należy powoli ssać lub rozpuszczać w jamie ustnej 1 tabletkę co 2-3 godziny.
- Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby.
- Nie należy połykać tabletek w całości. Nie żuć.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
- Nie należy przyjmować leku dłużej niż 4-5 dni bez zalecenia lekarza.

Skład

1 tabletki do ssania zawiera: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego (Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus), 0,6 mg amylometakrezolu (Amylmetacresolum), 5,9 mg lewomentolu (Levomentholum).

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Neo-angin.
- Nietolerancja fruktozy.
- Dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

- Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) obserwowano podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego.
- Mogą również wystąpić reakcje alergiczne.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25oC.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.