

Neocardina, krople, 40 g



Cena: 8,90 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	40 g
Opakowanie	40 g
Postać	krople doustne, roztwór
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

Lek w postaci kropli Neocardina to kompozycja nalewek z ziela konwalii, kwiatostanu głogu i korzenia kozłka.

Wskazania

Stany łatwego męczenia się, wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca (niewymagającym stosowania innych leków, bez objawów zastoju krążenia) i osłabieniu mięśnia sercowego u osób w wieku starszym.

Dawkowanie

- Doustnie, po posiłku z niewielką ilością płynu.
- Dorośli: 1 – 2 ml (20-40 kropli) 2 do 3 razy na dobę.
- Młodzież powyżej 12 lat: 0,5 – 1 ml (10-20 kropli) 2 do 3 razy na dobę.

Skład

100g kropli zawiera:

Substancje czynne: Convallariae tinctura titrata (1:4,0-4,5), ekstrahent: etanol 70% (v/v) 30,0 g, Crataegi folii cum flore tinctura (1:4,0-4,5), ekstrahent: etanol 70% (v/v) 20,0 g, Valerianae tinctura (1:4,0-4,5), ekstrahent: etanol 70% (v/v) 20,0 g.

1 ml (= 0,918 g) kropli zawiera 0,28 g nalewki konwaliowej mianowanej (1:4,0-4,5), 0,18 g nalewki z kwiatostanu głogu (1:4,0-4,5), 0,18 g nalewki kozłkowej (1:4,0-4,5). Ekstrahenty: etanol 70% V/V.

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, nalewka z owocu róży, nalewka z owocni pomarańczy gorzkiej, etanol 96% V/V.

Przeciwwskazania

- Nie podawać dzieciom w wieku do 12 lat,
- Nie stosować po upływie terminu ważności,

- Uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz jeśli u pacjenta występuje stan niedoboru potasu,
- Choroby wątroby, epilepsja, alkoholizm, ciąża i karmienie piersią,
- Nie zaleca się przyjmowania leku przed podróżą.

Przechowywanie

- W temperaturze nie wyższej niż 25°C,
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.