

Neosine 500 mg, 50 tabletek

Cena: 48,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	50 tabletek
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Inosinum pranobexum

Opis produktu

Wskazania

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Działanie

Przeciwwirusowe i zwiększające odporność organizmu.

Dawkowanie

- Stosować doustnie.
- Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 50 mg na kg masy ciała na dobę - zwykle 1 g, tj. 2 tabletki 3 razy na dobę.
- Nie należy przyjmować więcej, niż 8 tabletek na dobę.
- Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.
- Tabletkę należy popić dużą ilością płynu, najlepiej wodą. W razie trudności z połknięciem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Skład

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).

1 tabletkę zawiera 500 mg inozyny pranobeksu.

Pozostałe składniki to: skrobia pszeniczna, mannitol, powidon, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

U pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane

- Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów): przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi; podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi; nudności z wymiotami lub bez; ból brzucha; swędzenie, wysypka skórna; ból głowy lub zawroty głowy; zmęczenie, złe samopoczucie; bóle stawów.
- Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów): biegunka; zaparcia; nerwowość; senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność); wydalenie dużej ilości moczu (wielomocz).

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.