

Neosine Plus 500 mg + 3,125 mg, 50 tabletek

Cena: 66,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	500 mg + 3,125 mg
Opakowanie	50 tabletek
Postać	tabletki
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Inosinum pranobexum, Zinci gluconas

Opis produktu

Wskazania

Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 roku.

- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
- W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Lek Neosine plus może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.
- W stanach zwiększonego zapotrzebowania na cynk, występującego w wyżej wymienionych wskazaniach.

Działanie

- Zwiększa odporność.
- Przeciwwirusowe.

Dawkowanie

- Stosować doustnie.
- Zalecana dawka inozyliny pranobeksu to 50 mg na kg masy ciała na dobę.
- Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zwykle 2 tabletki 3 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę. Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyliny pranobeksu na dobę.
- Dzieci w wieku powyżej 1 roku: zalecana dawka inozyliny pranobeksu to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych. Dzieciom, które nie są w stanie połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku w syropie.
- Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów choroby przyjmować lek jeszcze przez 1 do 2 dni.

Skład

1 tabletkę zawiera 500 mg inozyliny pranobeksu (Inosinum Pranobexum) oraz 3,125 mg jonów cynku w postaci cynku glukonianu (Zinci gluconas).

Pozostałe składniki: skrobia pszczyczna, powidon 30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodulaurylosiarczan, mannitol, magnezu

stearynian.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne (inozyny pranobeks lub cynku glukonian) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
- Jeśli pacjent ma aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane

- Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów): przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi; nudności z wymiotami lub bez; ból brzucha; swędzenie, wysypka skórna; ból głowy lub zawroty głowy; zmęczenie, złe samopoczucie; bóle stawów.
- Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów): biegunka; zaparcia; nerwowość; senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność); wydalenie dużej ilości moczu (wielomocz).
- Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): Na początku leczenia, sole cynku mogą powodować niestrawność. Objawy te występują częściej jeśli

cynk przyjmowany jest na pusty żołądek. Objawy ustępują szybko po zaprzestaniu stosowania leku.

Przechowywanie

- W sposób niedostępny dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.